

# Beta-Amylase ile Nişasta Şekerleşmesi: Maltoz Odaklı Gıda, İçecek ve Fermantasyon Uygulamaları

Enzymes.bio Araştırma Ekibi · Wellington, Yeni Zelanda · June 21, 2026

Beta-amylase, nişasta zincirlerinin indirgenmeyen uçlarından ilerleyerek maltoz birimlerinin oluşumunu destekleyen bir amilaz enzimidir. Bu nedenle beta amylase ve beta-amylase aramalarında öne çıkan temel uygulama alanları; malt bazlı içecekler, fermantasyon, nişasta işleme ve maltoz profili yönetimidir. Enzymes.bio, Beta-Amylase ürününü 1 kg birimler halinde çevrim içi doğrudan tedarik eder; siparişe birlikte CoA ve SDS sağlar.

## Beta-Amylase Nedir ve Nişasta Dönüşümünde Neden Kullanılır?


Beta-Amylase, nişasta ve nişasta türevli polisakkaritlerin daha küçük karbonhidratlara dönüştürülmesinde kullanılan bir nişasta parçalayıcı enzimdir. Nişasta dönüşümü endüstride yalnızca “şeker elde etme” işlemi değildir; viskozitenin yönetilmesi, fermantasyon için uygun şeker profilinin oluşturulması, ürün dokusunun ayarlanması ve proses tekrarlanabilirliğinin artırılması gibi teknik hedefleri de kapsar. Nişasta dönüştürücü enzimler üzerine yapılan literatür, amilazların gıda, içecek, nişasta işleme ve biyoteknoloji gibi alanlarda temel biyokatalizörler arasında yer aldığını göstermektedir <sup>[1]</sup>.

Beta-Amylase’in ayırt edici yönü, nişasta zincirinin rastgele noktalarından değil, indirgenmeyen uçlarından kademeli şekilde ilerlemesidir. Bu mekanizma, özellikle maltoz oluşumunun hedeflendiği proseslerde beta-amylase kullanımını teknik olarak anlamlı kılar. Beta-amilazın aksiyon paterni üzerine klasik çalışmalar, enzimin zincir uçlarından düzenli ürün salımı ile karakterize olduğunu ve reaksiyonun basit bir “rastgele parçalama” davranışı göstermediğini ortaya koymuştur <sup>[2]</sup>.

Bu özellik, beta amylase’i maltlama, bira üretimi, distilasyon, şurup uygulamaları ve bazı gıda fermantasyonlarında değerli hale getirir. Nişastalı hammaddelerde bulunan amiloz ve amilopektin, doğrudan pek çok mikrobiyal veya teknolojik proses için ideal formda değildir; enzimatik hidroliz, bu büyük molekülleri daha işlenebilir karbonhidratlara dönüştürür. Beta-Amylase bu dönüşümde özellikle maltoz ağırlıklı bir şeker profiline katkı verdiği için, hedeflenen son ürünün fermentabilitesi veya tatlılık yapısı üzerinde etkili olabilir <sup>[3]</sup>.

## Çalışma Mekanizması: Beta-Amylase Nişastayı Nasıl Parçalar?

Nişasta, glukoz birimlerinden oluşan uzun zincirli bir karbonhidrattır. Amiloz daha çok doğrusal zincir yapısıyla, amilopektin ise dallanmış yapısıyla tanımlanır. Beta-Amylase, bu zincirlerin indirgenmeyen uçlarından başlayarak ardışık şekilde maltoz birimleri oluşturur; bu nedenle “exo-aktif” bir nişasta hidroliz davranışı gösterir. Beta-amilazın mekanizması üzerine yapılan çalışmalar, enzimin substrata bağlanma biçiminin ve bağ koparma düzeninin oluşan ürün profilini doğrudan belirlediğini göstermektedir [3].



**Figure 1.** 베타-아밀레이스는 접근 가능한  $\alpha$ -1,4 결합 전분 사슬의 비환원 말단에서 말토스를 단계적으로 방출한다.

Bu mekanizmayı pratik bir benzetmeyle açıklamak mümkündür: Nişasta zinciri, farklı noktalarda dallanan uzun bir boncuk dizisi gibi düşünülebilir. Alfa-amilaz bu dizinin iç bölgelerinde kesimler yaparak büyük zinciri daha küçük dekstrinlere bölerken, beta-amylase zincirin uç kısmından ikişer glukozluk maltoz birimleri çıkarır. Bu yüzden beta-amylase, nişastayı bir anda tamamen glukozla indirgeyen bir araç değil, maltoz odaklı ve uçtan ilerleyen kontrollü bir biyokatalizördür [2].

Dallanmış amilopektin yapısı beta-Amylase açısından önemlidir. Enzim doğrusal kısımlarda ilerleyebilir; ancak dallanma noktaları reaksiyonun ilerleyişini sınırlar ve hidroliz sonunda daha büyük dallanmış dekstrinler kalabilir. Bu durum, beta-amylase kullanılan proseslerde nişastanın yapısı, ön işlem durumu ve diğer enzimlerle kombinasyonun neden önemli olduğunu açıklar. Nişasta dönüştürücü enzimlerin farklı bağ tiplerine ve substrat yapılarına karşı farklı davranması, endüstriyel uygulamalarda hedef ürün profilinin enzim seçimiyle bağlantılı olduğunu gösterir [4].

Moleküler düzeyde beta-Amylase'in katalitik performansı, aktif bölgedeki amino asitlerin substratı doğru konumlandırmasına ve bağ koparma sürecini yönetmesine bağlıdır. Soya fasulyesi beta-amilazı üzerinde yapılan fonksiyonel analizler, belirli amino asit kalıntılarının katalitik mekanizmada kritik görevler üstlendiğini göstermiştir. Bu bulgu, beta-amylase performansının yalnızca “enzim varlığına” değil, enzimin yapısal bütünlüğüne, proses ortamına ve substratla etkileşimine bağlı olduğunu ortaya koyar [4].

## Beta-Amylase, Alpha-Amylase ve Glucoamylase Arasındaki Teknik Farklar

Nişasta işleme uygulamalarında beta-Amylase çoğu zaman alpha-amylase ve glucoamylase gibi diğer amilazlarla birlikte değerlendirilir. Bu enzimler aynı genel hammaddeye, yani nişastaya etki etse de çalışma noktaları ve hedef ürün profilleri farklıdır. Bu farklar, proses tasarımı “hangi enzim daha güçlüdür?” sorusundan çok “hangi enzim hangi dönüşümü sağlar?” sorusunun sorulmasını gerektirir [1].




Figure 2. 아밀로펙틴의 가지 지점은 베타-아밀레이스의 진행을 제한하고 베타-한계 덱스트린을 남긴다.

| Enzim tipi    | Temel çalışma yaklaşımı                            | Baskın ürün eğilimi      | Tipik teknik rol                              | Beta-Amylase ile ilişkisi                 |
|---------------|--|--------------------------|---|---|
| Beta-Amylase  | Zincirin indirgenmeyen uçlarından kademeli ilerler | Maltoz ağırlıklı profil  | Şekerleşme, fermentabilite ve maltoz yönetimi | Maltoz oluşumunda merkezî rol oynar       |
| Alpha-Amylase | Zincirin iç bölgelerinde kesim yapar               | Dekstrinler ve daha kısa | Viskozite düşürme, ön parçalama, sıvılaştırma | Beta-Amylase için daha erişilebilir uçlar |

| Enzim tipi                 | Temel çalışma yaklaşımı                   | Baskın ürün eğilimi                  | Tipik teknik rol                                   | Beta-Amylase ile ilişkisi  |
|----------------------------|---|--------------------------------------|--|--|
|                            |   | zincirler                            |  | oluşturabilir  |
| Glukoamylase               | Zincir uçlarından glukoz salımına yönelir | Glukoz ağırlıklı profil              | Glukoz üretimi ve yüksek sakkarifikasyon hedefleri | Maltoz yerine glukoz hedeflenen sistemlerde daha baskın olabilir |
| Dallanma giderici enzimler | Dallanma noktalarına etki eder            | Daha erişilebilir doğrusal zincirler | Amilopektin yapısının açılması                     | Beta-Amylase'in ilerleyebileceği zincir alanlarını artırabilir   |

Bu karşılaştırma, beta amylase'in özellikle maltoz hedeflenen proseslerde neden ayrı bir kategori olarak ele alındığını açıklar. Alpha-amylase nişastayı iç bölgelerden açarak viskozite ve substrat erişilebilirliği üzerinde etkili olabilir; beta-Amylase ise oluşan veya mevcut zincir uçlarından maltoz üretimini destekler. Nişasta dönüştürücü enzimlerin endüstriyel kullanımı, bu tamamlayıcı etkilerin doğru proses bağlamında değerlendirilmesine dayanır <sup>[1]</sup>.

## Başlıca Uygulama Alanları

### Maltlama, Brewing ve Malt Bazlı İçecekler

Malt bazlı içeceklerde nişastanın mayalanabilir şekere dönüşmesi temel bir proses adımıdır. Tahıl nişastası, maya tarafından doğrudan verimli şekilde kullanılacak formda değildir; bu nedenle şekerleşme aşaması, fermentasyon performansını ve son ürün profilini etkiler. Beta-Amylase, maltoz oluşumunu desteklediği için wort fermentabilitesi, gövde algısı ve maya besin profili üzerinde rol oynayabilecek enzimlerden biridir <sup>[2]</sup>.

Brewing uygulamalarında beta-amylase tek başına bütün nişasta dönüşümünü yöneten bir unsur olarak görülmemelidir. Maltın kendi enzim kompozisyonu, tahıl çeşidi, ezme sıcaklığı, pH aralığı, süre ve nişastanın jelatinizasyon durumu sonucu etkiler. Bununla birlikte beta-Amylase'in uçtan ilerleyen maltoz üretim karakteri, malt ve tahıl bazlı içeceklerde fermentasyon şekerlerinin planlanması açısından teknik bir avantaj sağlar <sup>[3]</sup>.

### Distilasyon ve Alkol Fermantasyonu

Distilasyon uygulamalarında tahıl, patates, mısır veya diğer nişastalı hammaddeler kullanıldığında, nişastanın fermente edilebilir şekerlere dönüştürülmesi gerekir. Beta-Amylase, bu dönüşümde maltoz oluşumunu artırmaya yardımcı olabilir; maltoz daha sonra uygun maya sistemleriyle fermentasyona

dahil olur. Nişasta hidrolizinde enzim seçimi, alkol verimi kadar yan ürün profili, proses süresi ve hammadde kullanım etkinliği açısından da önem taşır [1].




Figure 3. 알파-아밀레이스, 베타-아밀레이스, 포도당 생성 엑소아밀레이스는 절단 방식과 생성되는 당 조성이 서로 다르다.

Distilasyon proseslerinde beta-amylase'in etkisi, çoğu zaman ön parçalama aşamalarıyla birlikte değerlendirilir. Eğer nişasta granülleri yeterince erişilebilir değilse veya yüksek dallanmış yapı baskınsa, beta-Amylase'in ilerleyebileceği uç sayısı sınırlı kalabilir. Bu nedenle beta-amylase, pratikte alpha-amylase veya dallanma giderici enzimlerle tamamlayıcı bir mantık içinde konumlandırılabilir; bu yaklaşım hedeflenen şeker profilinin daha kontrollü oluşmasına yardım eder [2].

### Nişasta İşleme ve Maltoz Odaklı Şurup Uygulamaları

Nişasta işleme sektöründe amaç her zaman aynı değildir: bazı proseslerde glukoz ağırlıklı şurup, bazılarında dekstrin, bazılarında ise maltoz açısından zengin profil hedeflenir. Beta-Amylase, maltoz odaklı ürün profili istendiğinde öne çıkar. Enzimin indirgenmeyen uçlardan maltoz salması, onu rastgele zincir kıran amilazlardan farklılaştırır ve şeker bileşiminin daha öngörülebilir yönetilmesine katkı sağlar [3].

Bu uygulamalarda beta-amylase performansını belirleyen önemli faktörlerden biri substratın ön işlenmiş olup olmamasıdır. Jelatinizasyon, mekanik parçalama veya diğer enzimlerle ön hidroliz gibi faktörler nişastanın erişilebilirliğini değiştirir. Nişasta dönüştürücü enzim literatürü, substrat yapısının ve enzim tipinin ürün profilinde belirleyici olduğunu gösterdiğinden, beta-Amylase özellikle maltoz profili net hedeflenen sistemlerde anlamlı bir biyokatalizör olarak değerlendirilir [1].

## Gıda Fermantasyonları ve Formülasyon Yönetimi

Gıda fermantasyonlarında nişasta kaynaklı karbonhidratların dönüştürülmesi, mikrobiyal aktiviteyi ve son ürün özelliklerini etkileyebilir. Beta-Amylase, maltoz oluşumu yoluyla fermente edilebilir karbonhidrat profilini şekillendirebilir. Bu etki; hamur fermantasyonu, tahıl bazlı fermente içecekler, malt ekstraktları ve nişastalı gıda matrislerinde tatlılık, gövde ve reaksiyon süresi gibi özelliklerle ilişkilendirilebilir [2].




Figure 4. 베타-아밀레이스의 말토스 선택성은 사슬 말단을 두 개의 포도당 단위 방출에 맞게 정렬하는 활성 부위의 기하 구조에서 비롯된다.

Burada dikkat edilmesi gereken nokta, beta-amylase'in tek başına tüm formülasyon etkilerini açıklamadığıdır. Proteinler, lifler, yağlar, mineral kompozisyonu, doğal inhibitörler ve proses sıcaklığı gibi faktörler enzimatik hidrolizin pratik sonucunu değiştirebilir. Enzim immobilizasyonu ve gıda endüstrisi uygulamaları üzerine yapılan çalışmalar, enzimlerin gıda proseslerinde etkin araçlar olabileceğini; ancak performansın proses ortamı ve uygulama biçimiyle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini vurgular [5].

## Malzeme ve Modifiye Nişasta Uygulamaları


Beta-Amylase yalnızca şekerleşme ve fermantasyon için değil, nişastanın yapısal özelliklerini değiştirmek için de incelenmiştir. Kısmi beta-amylase kesimi uygulanmış nişastalar üzerine yapılan bir çalışma, kontrollü enzimatik budamanın malzeme uygulamalarında mekanik özellikleri etkileyebileceğini bildirmiştir. Bu, beta-amylase'in sadece "şeker üretimi" bağlamında değil, nişasta bazlı malzemelerin fonksiyonel özelliklerinin ayarlanması açısından da araştırıldığını gösterir [6].

Bu tür malzeme uygulamalarında temel fikir, nişasta zincir uzunluğu ve dallanma yapısındaki değişikliklerin film, jel veya kompozit davranışını etkileyebilmesidir. Beta-Amylase'in uçtan ilerleyen mekanizması, nişastayı tamamen parçalamadan kısmi yapı değişimi oluşturmak için kullanılabilir. Ancak bu alan, gıda ve içecek proseslerine kıyasla daha uygulamaya özel parametreler içerir; sonuçlar kullanılan nişasta kaynağına, işlem seviyesine ve nihai malzeme tasarımına bağlıdır [6].

## Proses Performansını Etkileyen Faktörler

Beta-Amylase performansı, enzim miktarından bağımsız olarak proses ortamının fiziksel ve kimyasal özelliklerine bağlıdır. Sıcaklık, pH, işlem süresi, karıştırma, substrat konsantrasyonu, nişastanın jelatinizasyon derecesi ve ortamda bulunan diğer bileşenler hidroliz sonucunu etkileyebilir. Nişasta dönüştürücü enzimler üzerine literatür, enzimlerin substrat yapısına ve reaksiyon koşullarına duyarlı biyokatalizörler olduğunu açık şekilde ortaya koymaktadır [1].

Nişastanın erişilebilirliği özellikle önemlidir. Ham nişasta granüllerinin kristalin ve yarı kristalin bölgeleri, enzimin zincir uçlarına erişimini sınırlayabilir. Isıl işlem veya uygun ön hazırlık ile nişasta zincirleri daha erişilebilir hale geldiğinde beta-Amylase'in maltoz oluşturma potansiyeli daha belirgin olabilir. Bu durum, beta-amylase uygulamalarında substrat hazırlığının neden yalnızca yardımcı bir adım değil, doğrudan proses sonucunu belirleyen bir faktör olduğunu açıklar [2].



**Figure 5.** 베타-아밀레이스를 효과적으로 사용하려면 전분의 접근성과 효소의 구조적 안정성이 서로 맞아야 한다.

pH ve sıcaklık etkisi de pratik açıdan kritiktir; ancak tek bir evrensel optimumdan söz etmek doğru değildir. Enzimin kaynağı, ürün formülasyonu, proses süresi ve matris kompozisyonu farklı olduğunda çalışma penceresi de değişebilir. Bu nedenle teknik değerlendirme, ürünle birlikte sağlanan CoA ve SDS

belgeleriyle uyumlu kullanım ve güvenlik çerçevesinde yapılmalıdır; Enzymes.bio bu belgeleri siparişle birlikte sağlar.

## Enzim Kombinasyonları: Beta-Amylase Tek Başına mı, Birlikte mi Kullanılır?

Beta-Amylase, maltoz oluşumu için güçlü bir araçtır; ancak nişastanın tüm yapısal karmaşıklığını tek başına çözmesi beklenmemelidir. Alpha-amylase iç bölgelerden zincirleri kısaltarak yeni uçlar oluşturabilir, beta-Amylase ise bu uçlardan maltoz salımını sürdürebilir. Bu nedenle bazı nişasta işleme sistemlerinde beta-amylase, diğer amilazlarla birlikte daha dengeli bir şekerleşme stratejisinin parçası olabilir <sup>[1]</sup>.

Bu kombinasyon yaklaşımı özellikle yüksek viskoziteli nişasta bulamaçlarında ve dallanmış amilopektin oranı yüksek hammaddelerde önem kazanır. Ön parçalama sayesinde zincir uzunluğu azalır ve beta-Amylase'in erişebileceği uç sayısı artabilir. Bununla birlikte kombinasyonun sonucu, enzimlerin sırayla mı yoksa aynı anda mı kullanıldığına, ortam koşullarına ve hedeflenen ürün profilinin maltoz, glukoz veya dekstrin ağırlıklı olmasına bağlıdır <sup>[3]</sup>.

İmmobilize enzim sistemleri de gıda endüstrisinde proses kontrolü, tekrar kullanım ve stabilite gibi başlıklar nedeniyle araştırılan bir alandır. Bu yaklaşım beta-amylase dahil birçok enzim kategorisi için teorik ve pratik ilgi taşır; ancak ticari ürün kullanımında immobilizasyon bilgisi doğrudan varsayılmamalıdır. Literatür, immobilize enzimlerin gıda proseslerinde potansiyel avantajlar sağlayabileceğini gösterse de, bu avantajlar kullanılan taşıyıcı, proses tasarımı ve enzim yapısına bağlıdır <sup>[5]</sup>.



**Figure 6.** 양조와 증류에서는 전분의 개방, 알파-아밀레이스에 의한 액화, 베타-아밀레이스에 의한 말토스 형성, 효모 발효가 서로 연결된 공정 단계로 작용한다.

## Kalite, Güvenlik ve Dokümantasyon Perspektifi

Endüstriyel enzim kullanımı, yalnızca proses performansı ile değil, belge yönetimi ve güvenli kullanım uygulamalarıyla da ilgilidir. Enzim tozlarıyla çalışırken toz oluşumunun kontrol edilmesi, inhalasyon riskinin azaltılması, uygun kişisel koruyucu önlemlerin alınması ve ürün güvenlik bilgilerinin operasyon ekibince dikkate alınması gerekir. Bu çerçevede SDS, iş sağlığı ve güvenliği değerlendirmeleri için temel dokümandır.

CoA ise sipariş edilen ürünle ilgili parti bazlı kalite bilgisinin izlenmesine yardımcı olur. Enzymes.bio, üretici veya laboratuvar olarak konumlanmaz; Beta-Amylase ürününü çevrim içi tedarik modeliyle sunar ve siparişe birlikte CoA ile SDS sağlar. Bu ayırım, ürünün teknik dokümantasyonunun profesyonel kullanım için sağlandığını, ancak Enzymes.bio'nun üretim veya analiz hizmeti sunduğu anlamına gelmediğini netleştirir.

Depolama ve taşıma açısından enzim ürünleri genellikle nem, aşırı sıcaklık ve kontaminasyondan korunmalıdır. Beta-Amylase gibi protein yapılı biyokatalizörlerde uygunsuz çevre koşulları performans kaybına yol açabilir. Bu nedenle ürün, siparişe sağlanan belgelerde belirtilen kullanım ve güvenlik bilgileri dikkate alınarak değerlendirilmelidir.

## Beta-Amylase Kullanımının B2B Değeri

Beta-Amylase'in B2B değerinin merkezinde, nişastadan maltoz ağırlıklı şeker profili oluşturma kapasitesi bulunur. Bu özellik, özellikle malt bazlı içecekler, tahıl fermantasyonları, distilasyon ve maltoz odaklı şurup uygulamalarında proses hedefleriyle doğrudan ilişkilidir. Beta-amilazın uçtan ilerleyen aksiyon paterni, ürün profilinin rastgele hidrolize kıyasla daha belirli bir yöne taşınmasına yardımcı olur <sup>[2]</sup>.




Figure 7. 베타-아밀레이스는 양조, 증류, 곡물 발효, 고말토스 시럽 생산 등 말토스가 풍부한 당류 흐름이 필요한 곳에 사용된다.

İkinci önemli değer, proses tekrarlanabilirliğine katkıdır. Hammadde kaynaklı doğal enzim aktivitesi, tahıl çeşidi ve depolama geçmişi gibi faktörlere göre değişebilir. Dışarıdan tanımlı bir beta-amylase kullanımı, proses ekibine şekerleşme aşamasında daha yönetilebilir bir araç sunar. Nişasta dönüştürücü enzimlerin endüstride yaygın kullanılmasının temel nedenlerinden biri, biyokatalizörlerin belirli reaksiyonları hedefe yönelik biçimde hızlandırabilmesidir <sup>[1]</sup>.

Üçüncü değer, diğer nişasta enzimleriyle tamamlayıcı çalışabilmesidir. Beta-Amylase, alpha-amylase tarafından oluşturulan daha kısa zincirlerden maltoz salımını sürdürebilir; glucoamylase ile birlikte kullanıldığında ise son şeker kompozisyonu farklı bir yöne kayabilir. Bu tamamlayıcılık, beta amylase ürünlerinin tek başına değil, nişasta dönüşüm stratejisinin bir bileşeni olarak da değerlendirilebilmesini sağlar <sup>[3]</sup>.

## Enzymes.bio Ürün Konumlandırması

Enzymes.bio tarafından tedarik edilen Beta-Amylase, nişasta bazlı uygulamalarda maltoz oluşumunu desteklemek isteyen profesyonel kullanıcılar için çevrim içi satın almaya uygun bir enzim ürünüdür. Ürün 1 kg birimler halinde doğrudan satılır; sipariş süreci çevrim içi yürütülür ve ödeme sonrası sipariş işleme alınır. Enzymes.bio'nun rolü üretim yapmak, laboratuvar analizi sunmak veya özel proses geliştirme hizmeti vermek değil, ürünü tedarik etmek ve siparişle birlikte ilgili belgeleri sağlamaktır.

Bu konumlandırma, özellikle gıda, içecek, fermantasyon ve nişasta işleme alanlarında çalışan ekipler için pratik bir satın alma modeli sunar. Beta-Amylase'in teknik değeri, ürünün "genel amaçlı amilaz" olarak görülmesinden değil, maltoz odaklı nişasta dönüşümündeki belirgin mekanizmasından gelir. CoA ve SDS'nin siparişle birlikte sağlanması, operasyon ekiplerinin kalite ve güvenlik dokümantasyonunu kendi iç süreçlerine dahil etmesini kolaylaştırır.




Figure 8. 가공 이력은 베타-아밀레이스가 물리적으로 접근할 수 있는 전분 사슬 말단의 수를 좌우한다.

## Sonuç: Beta-Amylase Ne Zaman Anlamalı Bir Seçimdir?

Beta-Amylase, hedefin nişastadan maltoz oluşumunu desteklemek olduğu durumlarda teknik olarak anlamlı bir enzimdir. İndirgenmeyen uçlardan ilerleyen mekanizması, onu iç bölgelerden rastgele kesim yapan amilazlardan ayırır ve özellikle fermentabilite, malt bazlı içecekler, distilasyon ve maltoz profili yönetimi açısından önemli hale getirir [2].

Bununla birlikte beta-amylase performansı, substrat erişilebilirliği, nişasta tipi, dallanma yapısı, pH, sıcaklık, süre ve eşlik eden enzimlerle birlikte değerlendirilmelidir. En iyi sonuç, enzimin mekanizmasının proses hedefiyle uyumlu olduğu; yani maltozun istenen ürün profilinde önemli yer tuttuğu uygulamalarda beklenir. Nişasta dönüştürücü enzimler üzerine literatür, bu tür biyokatalizörlerin doğru bağlamda kullanıldığında endüstriyel proseslerde yüksek teknik değer sunduğunu desteklemektedir <sup>[1]</sup>.

Enzymes.bio'nun Beta-Amylase ürünü, 1 kg çevrim içi doğrudan satış modeliyle profesyonel kullanıcıların nişasta dönüşümü odaklı çalışmalarında değerlendirebileceği bir tedarik seçeneğidir. Ürünle birlikte CoA ve SDS sağlanması, kalite ve güvenlik dokümantasyonunun sipariş sürecine eşlik etmesini sağlar; Enzymes.bio ise bu süreçte üretici veya laboratuvar değil, enzim tedarikçisi olarak konumlanır.

### Beta-Amylase ürünü online sipariş edin

1 kg birimler halinde satılır; stokta mevcut ve sevkiyata hazırdır. Mağazamızdan doğrudan sipariş verin — online ödeme yapın, siparişinizi işleme alalım. Her siparişe Analiz Sertifikası ve Güvenlik Bilgi Formu dahildir.

[Beta-Amylase satın alın →](#)

## Kaynaklar

İlk atıf sırasına göre numaralandırılmıştır. Açık erişimli kaynaklardır; her birinin yayım sırasında erişilebilir olduğu doğrulanmıştır. Metindeki atıf numaraları buraya bağlantı verir:

1. Maarel, M. V. D., Veen, B. A., Uitdehaag, J., Leemhuis, H., & Dijkhuizen, L. (2002). Properties and applications of starch-converting enzymes of the alpha-amylase family. *Journal of Biotechnology*, 94 2, 137-55 .
2. Bailey, J., & Whelan, W. (1957). The mechanism of carbohydrase action. 3. The action pattern of beta-amylase. *Biochemical Journal*, 67 4, 540-7 .
3. Hehre, E., Brewer, C., & Genghof, D. S. (1979). Scope and mechanism of carbohydrase action. Hydrolytic and nonhydrolytic actions of beta-amylase on alpha- and beta-maltosyl fluoride. *Journal of Biological Chemistry*, 254 13, 5942-50 .
4. Totsuka, A., & Fukazawa, C. (1996). Functional analysis of Glu380 and Leu383 of soybean beta-amylase. A proposed action mechanism. *European Journal of Biochemistry*, 240 3, 655-9 .
5. Jothyswarupha, K. A., Venkataraman, S., Rajendran, D., Shri, S., Sivaprakasam, S., Yamini, T., Karthik, P., ... et al. (2024). Immobilized enzymes: exploring its potential in food industry applications. *Food Science and Biotechnology*, 34, 1533 - 1555.

6. Monnet, D., Joly, C., Dole, P., & Bliard, C. (2010). Enhanced mechanical properties of partially beta-amylase trimmed starch for material applications. *Carbohydrate Polymers*, 80, 747-752.

## Enzymes.bio ile iletişime geçin

Siparişinizle ilgili sorularınız mı var? Ekibimiz yardımcı olmaktan memnuniyet duyar.

E-POSTA [wholesale@enzymes.bio](mailto:wholesale@enzymes.bio)

TELEFON (ABD) **+1 (507) 428-6057**

[Bize ulaşın →](#)



**400+** B2B müşteriler



**60+** üniversite araştırma ortakları



**54** dünya genelinde hizmet

© 2026 Enzymes.bio · Endüstriyel ve gıda işleme enzim tedariki · İnsan tüketimi veya perakende satış için değildir.