

# Hemicellulase Enzyme For Baking : hémicellulase pour panification, pains, buns et farines riches en fibres

Équipe de recherche Enzymes.bio · Wellington, Nouvelle-Zélande · June 19, 2026

**Réponse directe** — L'hémicellulase pour boulangerie est une enzyme utilisée pour modifier certaines hémicelluloses de la farine, notamment les xylanes et arabinoxylanes, afin d'améliorer la maniabilité, la souplesse et la régularité de la pâte. En panification, elle agit surtout sur les polysaccharides non amylacés des parois végétales, et non directement sur le gluten ou l'amidon. Le produit **Hemicellulase Enzyme For Baking** est fourni par Enzymes.bio en unité de **1 kg**, avec certificat d'analyse et fiche de données de sécurité fournis avec la commande .

## Rôle de l'hémicellulase en boulangerie

L'hémicellulase est une enzyme pertinente en boulangerie parce que la farine n'est pas seulement un mélange d'amidon et de protéines. Elle contient aussi des fragments de parois végétales issus du grain, notamment des hémicelluloses, qui influencent l'absorption d'eau, la viscosité, la tenue mécanique et le comportement de la pâte au pétrissage. Les hémicelluloses sont décrites comme des polysaccharides de paroi végétale associés à la cellulose, participant à l'architecture des tissus végétaux et à leurs propriétés mécaniques <sup>[1]</sup>.

Dans une pâte boulangère, ces fractions pariétales peuvent être utiles ou problématiques selon leur quantité, leur solubilité, leur degré de ramification et la formulation. Une farine blanche panifiable, une farine complète, une farine riche en son ou un mélange multicéréales ne contiennent pas les mêmes proportions de fibres végétales ni les mêmes types de polysaccharides. L'intérêt pratique de l'hémicellulase est donc de modifier partiellement ces polymères afin de rendre la pâte plus régulière, plus extensible et plus facile à conduire dans un procédé artisanal ou industriel <sup>[2]</sup>.


Le produit **Hemicellulase Enzyme For Baking** d'Enzymes.bio s'inscrit dans cette logique d'auxiliaire technologique pour applications de panification. Enzymes.bio agit comme fournisseur en ligne, et non comme fabricant ni laboratoire ; le produit est proposé directement en unité de 1 kg, avec les documents associés à la commande .

## Que sont les hémicelluloses dans la farine ?

Le terme « hémicellulose » ne désigne pas une molécule unique. Il regroupe plusieurs familles de polysaccharides végétaux, généralement plus hétérogènes et plus ramifiés que la cellulose. Ces polymères peuvent contenir différents sucres, dont le xylose, le mannose, le galactose, l'arabinose et des dérivés acides selon l'origine végétale et la structure concernée <sup>[1]</sup>.

Les hémicelluloses se trouvent dans les parois cellulaires des plantes, où elles interagissent avec les microfibrilles de cellulose et d'autres constituants pariétaux. Elles contribuent à la cohésion de la paroi, à sa flexibilité et à sa résistance. Cette fonction explique pourquoi, même après mouture, les fragments de parois présents dans la farine continuent d'avoir un effet technologique sur l'hydratation, la viscosité et la texture de la pâte <sup>[3]</sup>.

Dans les céréales utilisées en boulangerie, les xylanes et arabinoxylanes sont particulièrement importants. Les arabinoxylanes sont des polysaccharides à squelette de xylose portant des ramifications, notamment d'arabinose ; leur structure conditionne leur solubilité, leur capacité à lier l'eau et leur effet sur la rhéologie de la pâte. Les sources générales sur l'hémicellulose soulignent cette diversité structurale, qui justifie l'emploi du terme au pluriel dans un contexte alimentaire <sup>[4]</sup>.



**Figure 1.** L'hémicellulase améliore la pâte en hydrolysant les arabinoxylanes du blé en fragments solubles plus courts, ce qui libère l'eau liée et favorise la rétention des gaz.

Cette diversité est essentielle pour comprendre les performances d'une hémicellulase. Une enzyme de cette famille ne transforme pas indistinctement toutes les fibres de la farine : elle hydrolyse certaines liaisons présentes dans certains types d'hémicelluloses. L'effet observé dépend donc de la farine, de la

recette, du temps de contact, de l'hydratation, de la température de pâte et de l'ensemble des autres ingrédients.

## Mécanisme d'action : ce que l'enzyme modifie réellement

L'action d'une hémicellulase repose sur l'hydrolyse enzymatique de liaisons glycosidiques présentes dans les hémicelluloses. En pratique, cela signifie que l'enzyme coupe certaines chaînes longues ou ramifiées en fragments plus courts, ce qui modifie leur comportement dans l'eau et dans la matrice de pâte. On ne parle donc pas d'une destruction globale de la farine, mais d'une modification ciblée d'une fraction fibreuse <sup>[2]</sup>.

Cette modification peut avoir plusieurs conséquences technologiques. Des hémicelluloses de grande taille ou fortement hydratées peuvent augmenter la viscosité, retenir une partie de l'eau et gêner l'extensibilité de la pâte. Leur hydrolyse partielle peut redistribuer l'eau, réduire certaines contraintes mécaniques et améliorer la souplesse. Dans une pâte suffisamment équilibrée, cette action peut contribuer à une meilleure tolérance au pétrissage, au façonnage et à la fermentation.

L'hémicellulase n'a pas le même rôle qu'une amylase, qu'une protéase ou qu'une oxydase. Elle ne cible pas principalement l'amidon, ne cherche pas à affaiblir directement le réseau glutineux et n'agit pas comme agent oxydant. Son intérêt est plutôt de gérer une composante moins visible mais très influente de la farine : les polysaccharides non amylacés des parois végétales, en particulier ceux qui participent à la rétention d'eau et à la viscosité.


Cette distinction est importante pour éviter les attentes excessives. Une hémicellulase ne corrige pas à elle seule une farine inadaptée, un pétrissage insuffisant, une fermentation mal conduite ou une formulation déséquilibrée. Elle peut cependant apporter un levier précis lorsque le comportement de pâte est influencé par les fractions hémicellulosiques, notamment dans les pains complets, pains aux céréales, buns, pains de mie ou pâtes industrielles riches en ingrédients végétaux.

## Comparaison avec d'autres cibles technologiques de la pâte

Cible dans la pâte	Constituants concernés	Enzymes ou leviers associés	Effet technologique recherché	Différence avec l'hémicellulase
Hémicelluloses	Xylanes, arabinoxylnes, autres polysaccharides pariétaux	Hémicellulase, xylanase selon la spécificité	Souplesse, gestion de l'eau, réduction de certaines viscosités, meilleure régularité	Action sur les fibres végétales non amylacées

Cible dans la pâte	Constituants concernés	Enzymes ou leviers associés	Effet technologique recherché	Différence avec l'hémicellulase
Amidon	Amylose, amylopectine, amidon endommagé	Amylases	Production de sucres fermentescibles, coloration, moelleux, conservation	Cible glucidique différente, centrée sur l'amidon
Protéines	Glutenines, gliadines, réseau glutineux	Pétrissage, oxydation, réduction, protéases selon le cas	Force, extensibilité, élasticité	L'hémicellulase n'est pas un modificateur direct du gluten
Lipides et interfaces	Lipides de farine, émulsifiants, bulles de gaz	Émulsifiants, lipases selon formulation	Stabilisation des alvéoles, volume, texture	Effet indirect possible, mais cible principale différente
Fibres insolubles	Sons, particules végétales, parois cellulaires	Hydratation, mouture, enzymes adaptées	Réduction de dureté, amélioration de la machinabilité	L'hémicellulase peut aider si les hémicelluloses sont impliquées

Ce tableau met en évidence que l'hémicellulase doit être positionnée comme un outil de gestion de la fraction pariétale de la farine. Elle peut interagir avec les autres leviers de formulation, mais son mécanisme central reste l'hydrolyse de certaines hémicelluloses, c'est-à-dire de polysaccharides présents dans les parois végétales <sup>[1]</sup>.



**Figure 2.** En panification, l'hémicellulase est ajoutée lors du pétrissage de la pâte et agit pendant l'apprêt et le début de la cuisson, avant d'être inactivée dans le four.

## Effets attendus sur la pâte

### Souplesse et extensibilité

L'un des effets recherchés en boulangerie est l'amélioration de la souplesse de pâte. Lorsque certaines hémicelluloses retiennent fortement l'eau ou augmentent la viscosité, la pâte peut devenir ferme, courte, collante ou difficile à étirer selon la farine et le niveau d'hydratation. L'hydrolyse partielle de ces polymères peut réduire cette contrainte et rendre la pâte plus extensible, surtout dans les formulations où les fibres végétales jouent un rôle important <sup>[2]</sup>.

La souplesse n'est toutefois pas synonyme de relâchement excessif. Une pâte trop relâchée peut perdre en tenue, coller aux équipements ou donner des pièces moins régulières. L'objectif de l'hémicellulase en panification est donc un équilibre : suffisamment d'action pour améliorer la maniabilité, mais pas au point de déstructurer la pâte ou de perturber le façonnage.


### Gestion de l'eau

Les hémicelluloses ont une forte importance technologique parce qu'elles interagissent avec l'eau. Dans une farine, elles peuvent contribuer à l'absorption globale, à la viscosité de la phase aqueuse et à la disponibilité de l'eau pour l'amidon, les protéines et les levures. Cette fonction est liée à leur nature de polysaccharides pariétaux et à leur capacité à s'associer à d'autres constituants végétaux <sup>[3]</sup>.

En modifiant certaines chaînes hémicellulosiques, l'enzyme peut changer la manière dont l'eau est retenue ou libérée dans la pâte. Cela peut se traduire par une pâte plus régulière au pétrissage, une hydratation plus homogène et une meilleure tolérance lors des étapes de repos. Ces effets sont particulièrement pertinents lorsque la farine contient davantage de particules de son ou d'ingrédients céréaliers complets.

### Tolérance de procédé

Sur une ligne industrielle, la régularité de la pâte est aussi importante que la qualité finale du pain. Une pâte trop variable peut affecter le divisage, le boulage, le laminage, le façonnage, la pousse et la cuisson. L'hémicellulase peut contribuer à limiter certaines variations liées aux polysaccharides de paroi, notamment lorsque les lots de farine présentent des comportements d'hydratation différents.



**Figure 3.** L'hémicellulase de panification est principalement utilisée pour augmenter le volume du pain, améliorer la structure de la mie, assouplir la texture et améliorer l'aptitude au façonnage des produits à base de blé.

Cette tolérance de procédé reste dépendante du système complet. La température de pâte, le temps de pétrissage, la fermentation, le sel, le sucre, les matières grasses, les améliorants et la présence d'autres enzymes peuvent modifier l'effet final. L'hémicellulase doit donc être considérée comme un composant de formulation, non comme un réglage isolé.

### Texture et mie

L'action sur les hémicelluloses peut aussi influencer la mie. Une pâte plus homogène, plus souple et mieux hydratée peut favoriser une structure alvéolaire plus régulière dans certains produits. Les sources techniques sur l'usage des hémicellulases en boulangerie indiquent leur intérêt pour stabiliser

la pâte, améliorer sa flexibilité et contribuer à la qualité du pain <sup>[2]</sup>.

L'amélioration de la mie ne doit cependant pas être présentée comme automatique. Elle dépend de la force de la farine, de la fermentation, du développement du réseau glutineux, de la rétention de gaz, de la cuisson et de la formulation globale. L'hémicellulase agit sur une partie du système ; son effet final est donc le résultat d'interactions multiples.

## **Applications en panification**

---


### **Pains blancs et pains courants**

Dans les pains blancs ou pains courants, la fraction hémicellulosique est moins dominante que dans les pains complets, mais elle reste technologiquement active. Une hémicellulase peut être utilisée pour améliorer la régularité de pâte lorsque la farine présente des variations d'absorption ou de comportement au pétrissage. Elle peut aussi aider à obtenir une pâte plus souple sans modifier fortement la formulation.

Pour ce type d'application, l'effet recherché est généralement modéré : meilleure maniabilité, meilleure tolérance de fermentation et mie plus régulière. L'enzyme ne remplace pas le choix d'une farine adaptée ni la maîtrise du pétrissage, mais elle peut compléter ces paramètres lorsque les hémicelluloses influencent la conduite du procédé.

### **Pains de mie et produits moelleux**

Les pains de mie, buns et pains burger demandent souvent une pâte souple, extensible, régulière et compatible avec des cadences de production répétées. Dans ces produits, la régularité de la mie, le volume, la symétrie des pièces et la stabilité au façonnage sont des critères importants. Une hémicellulase peut contribuer à ces objectifs en agissant sur les fractions de paroi végétale qui influencent l'eau et la viscosité.



**Figure 4.** Par rapport à une correction de pâte sans enzyme, l'hémicellulase peut offrir un meilleur volume et une mie plus moelleuse à faible dose en modifiant l'hémicellulose de la farine.

Les formulations de pains moelleux contiennent souvent sucre, matières grasses, agents de texture ou autres enzymes. L'hémicellulase doit donc être intégrée avec prudence dans l'équilibre global. Son action peut être favorable lorsqu'elle améliore la flexibilité de la pâte, mais elle doit rester compatible avec la tenue mécanique nécessaire au façonnage et à la pousse.

### **Pains complets, multicéréales et riches en fibres**

Les pains complets, pains aux graines, pains multicéréales et produits enrichis en fibres sont les applications où la logique de l'hémicellulase est la plus intuitive. Ces formulations contiennent davantage de fractions de paroi végétale : son, particules céréalières, fibres insolubles, enveloppes de grains ou farines moins raffinées. Les hémicelluloses y jouent un rôle plus visible dans la rétention d'eau, la densité de pâte et la texture finale <sup>[4]</sup>.

Dans ce contexte, l'hémicellulase peut aider à réduire certaines sensations de dureté ou de compacité en modifiant partiellement les polysaccharides hémicellulosiques. Elle peut aussi améliorer la machinabilité de pâtes qui deviennent difficiles à travailler à cause d'une forte absorption d'eau ou d'un excès de viscosité. L'objectif n'est pas d'effacer le caractère complet ou fibreux du produit, mais de le rendre plus régulier et plus agréable à transformer.

## Pâtes industrielles, surgelées ou préfermentées


Dans les procédés industriels, les pâtes peuvent subir des contraintes supplémentaires : temps d'attente, division mécanique, façonnage intensif, refroidissement, congélation, décongélation ou fermentation différée. Ces étapes amplifient parfois les effets de la variabilité des farines. Une hémicellulase peut être pertinente si la fraction hémicellulosique contribue à des variations de fermeté, de collant ou d'extensibilité.

Dans les produits surgelés ou préfermentés, l'effet doit être interprété avec attention. Les cycles de température, la durée de stockage, la levure, l'activité de l'eau et les autres améliorants influencent fortement la pâte. L'hémicellulase peut participer à l'optimisation de la texture avant cuisson, mais elle ne constitue pas à elle seule une solution de stabilité au froid.

## Paramètres qui influencent la performance

### Type de farine

Le premier déterminant est la farine. Une farine issue d'un grain différent, d'un taux d'extraction plus élevé ou d'une mouture plus riche en particules de son peut contenir davantage d'hémicelluloses accessibles. Les hémicelluloses étant des constituants de paroi végétale, leur proportion et leur structure varient selon la matière première et la partie du grain représentée dans la farine <sup>[1]</sup>.



**Figure 5.** Activité relative de l'enzyme hémicellulase pour la panification en fonction du pH, montrant un plateau optimal à pH 5,0–5,8.

Cette variabilité explique pourquoi une même utilisation peut produire un effet perceptible dans une farine complète et plus discret dans une farine très raffinée. Elle explique aussi pourquoi les résultats doivent être interprétés à l'échelle de la recette réelle, et non à partir d'une seule propriété théorique

de l'enzyme.

### **Hydratation et temps de contact**

L'hémicellulase agit dans un milieu contenant de l'eau disponible. L'hydratation de la pâte conditionne donc la mobilité de l'enzyme, l'accessibilité du substrat et la vitesse d'apparition des effets technologiques. Une pâte très ferme peut limiter la diffusion, tandis qu'une pâte plus hydratée peut favoriser le contact entre enzyme et hémicelluloses.

Le temps de contact joue également un rôle. L'action peut commencer pendant le mélange et se poursuivre durant le repos ou la fermentation, tant que les conditions restent compatibles avec l'activité enzymatique. Un temps plus long peut rendre l'effet plus marqué, ce qui nécessite une formulation équilibrée pour éviter une pâte trop relâchée.


### **Température de pâte et cuisson**

Comme toutes les enzymes, l'hémicellulase est sensible à la température. Elle agit principalement avant la cuisson et au début des phases où la pâte reste hydratée et à une température compatible avec l'activité enzymatique. Pendant la cuisson, l'élévation thermique modifie progressivement les protéines, l'amidon et l'activité enzymatique, ce qui limite ensuite l'action de l'enzyme.

La température de pâte avant cuisson reste donc un paramètre important. Une pâte plus chaude peut accélérer certaines transformations enzymatiques, tandis qu'une pâte plus froide peut les ralentir. Cette sensibilité doit être prise en compte dans les procédés longs, différés ou réfrigérés.

### **Interaction avec les autres ingrédients**

Les autres composants de la recette peuvent modifier l'effet de l'hémicellulase. Le sel influence la structure de pâte et la fermentation ; les sucres et matières grasses modifient l'activité de l'eau, la texture et la tolérance mécanique ; les fibres ajoutées augmentent la charge pariétale ; les autres enzymes peuvent agir sur l'amidon, les protéines ou les lipides. L'effet final résulte donc d'un système complet.



**Figure 6.** Activité relative de l’enzyme hémicellulase pour la panification en fonction de la température, avec un optimum à 35–45 °C et une baisse caractéristique liée à la dénaturation thermique au-delà de l’optimum.

Cette interaction explique pourquoi l’hémicellulase est particulièrement intéressante dans une approche de formulation technique. Elle permet d’agir sur une cible précise — les hémicelluloses — mais son bénéfice se mesure dans la pâte entière : comportement au pétrissage, collant, extensibilité, tenue, fermentation, volume et qualité de mie.

## Niveau de preuve et interprétation technique

Les données les plus robustes concernent la nature des hémicelluloses : ce sont des polysaccharides végétaux de paroi, associés à la cellulose et présents dans de nombreuses matières végétales. Leur diversité de structure et leur rôle dans la paroi expliquent leur influence sur les propriétés physiques des farines et des matrices alimentaires <sup>[1]</sup>.


Les sources techniques disponibles sur les hémicellulases décrivent leur capacité à hydrolyser les hémicelluloses et mentionnent leur emploi dans des applications alimentaires, dont la boulangerie, pour améliorer la stabilité, la flexibilité de pâte et la qualité du pain <sup>[2]</sup>. Ces indications sont cohérentes avec le mécanisme attendu : en modifiant des polymères capables de retenir l’eau et d’augmenter la viscosité, l’enzyme peut modifier la rhéologie de la pâte.

Il faut néanmoins distinguer mécanisme démontré et performance applicative. Le mécanisme général — hydrolyse de certaines hémicelluloses — est clair. En revanche, l’ampleur du bénéfice sur un pain donné dépend de nombreux facteurs : type de farine, formulation, temps de fermentation,

température, intensité de pétrissage, équipement et présence d'autres améliorants. Une communication technique fiable doit donc présenter l'hémicellulase comme un levier de maîtrise, non comme une garantie universelle de volume ou de moelleux.

## Positionnement du produit Enzymes.bio

**Hemicellulase Enzyme For Baking** est destiné aux utilisateurs professionnels qui recherchent une enzyme de boulangerie disponible en ligne pour des applications de panification. Enzymes.bio fournit le produit en unité de **1 kg** ; la commande est traitée après paiement en ligne, et le certificat d'analyse ainsi que la fiche de données de sécurité sont fournis avec la commande .



**Figure 7.** Relation dose–réponse illustrative de l'enzyme hémicellulase pour la panification dans la plage d'utilisation recommandée (0,005–0,03 %).

Il est important de positionner correctement le rôle d'Enzymes.bio : l'entreprise agit comme fournisseur, et non comme fabricant ni laboratoire. Les informations techniques doivent donc être utilisées comme aide à la compréhension du produit et de son application, sans présumer d'un procédé de fabrication interne ou de prestations analytiques réalisées par Enzymes.bio.

Une page produit distincte consacrée à une xylanase-hémicellulase pour la boulangerie illustre aussi le lien technologique entre hémicellulase, xylanase et panification : les xylanes et arabinoxylanes étant des hémicelluloses importantes dans les céréales, une activité de type xylanase peut être pertinente pour agir sur cette fraction dans les pâtes boulangères .

## Bon usage en formulation boulangère


L'utilisation d'une hémicellulase doit être progressive et adaptée au produit fini. Le point central est d'observer la pâte : fermeté, collant, extensibilité, tolérance au pétrissage, comportement au façonnage et stabilité pendant la fermentation. Une action insuffisante peut être peu perceptible ; une action excessive peut donner une pâte trop souple, collante ou difficile à tenir.

L'incorporation doit viser une dispersion homogène dans la masse de pâte. Une répartition irrégulière peut produire des zones aux comportements différents, surtout dans les pâtes riches en fibres ou à hydratation élevée. Dans la pratique, l'enzyme est généralement envisagée comme un ingrédient fonctionnel intégré à la formulation, en cohérence avec les autres composants secs et liquides.

Le suivi doit porter sur le système complet plutôt que sur un seul indicateur. Une pâte plus souple n'est intéressante que si elle conserve une bonne tenue, fermente correctement et donne une mie conforme aux attentes. De même, une meilleure absorption apparente de l'eau doit rester compatible avec le façonnage, le volume, la texture et la qualité sensorielle du produit fini.

## Points de vigilance techniques

Le premier point de vigilance est la sur-action enzymatique. Comme l'hémicellulase modifie des polymères qui contribuent à la structure et à la viscosité, un effet trop marqué peut se traduire par une pâte relâchée, collante ou moins stable. Ce risque est plus sensible dans les procédés longs, les pâtes très hydratées ou les formulations où plusieurs enzymes agissent simultanément.



**Figure 8.** Décroissance illustrative de la stabilité thermique de l'enzyme hémicellulase pour la panification — l'activité résiduelle diminue au fil du temps à la température de fonctionnement.

Le deuxième point est la variabilité des farines. Une farine complète, une farine riche en son ou un mélange multicéréales peut répondre plus fortement qu'une farine blanche standard, car les hémicelluloses y sont plus présentes ou plus influentes. Les hémicelluloses étant naturellement variables selon l'origine végétale et la structure pariétale, leur comportement ne peut pas être entièrement déduit d'une recette générique <sup>[4]</sup>.

Le troisième point concerne l'interprétation des effets. Si une pâte devient plus extensible après incorporation d'hémicellulase, cela ne signifie pas que le gluten a été directement renforcé ou affaibli. L'explication la plus cohérente est une modification des polysaccharides de paroi, avec un effet indirect sur l'eau disponible, la viscosité et l'organisation de la pâte.

## Synthèse pour les professionnels de la panification

L'hémicellulase pour boulangerie est un outil technologique ciblé pour agir sur les hémicelluloses des farines, notamment les xylanes et arabinoxylanes. Son intérêt repose sur une base mécanistique solide : les hémicelluloses sont des polysaccharides de paroi végétale, associés à la cellulose, capables d'influencer l'hydratation, la rigidité, la flexibilité et la texture des matrices céréalières <sup>[1]</sup>.

Dans les applications de panification, l'effet attendu est une pâte plus régulière, plus souple et plus facile à travailler, avec un intérêt particulier pour les pains complets, pains aux céréales, pains de mie, buns et lignes industrielles où la variabilité de farine peut devenir un enjeu. Les sources techniques disponibles relient l'usage des hémicellulases à la stabilisation de la pâte, à l'amélioration de sa flexibilité et à la qualité du pain <sup>[2]</sup>.

Le produit **Hemicellulase Enzyme For Baking** fourni par Enzymes.bio répond à cette application comme enzyme de boulangerie disponible en ligne en format 1 kg. Le certificat d'analyse et la fiche de données de sécurité sont fournis avec la commande, dans le cadre d'une fourniture directe du produit par Enzymes.bio .

### Commander Hemicellulase Enzyme For Baking en ligne

Vendu par unité de 1 kg, en stock et prêt à expédier. Commandez directement sur notre boutique — payez en ligne et nous traitons votre commande. Un certificat d'analyse et une fiche de données de sécurité sont inclus avec chaque commande.

[Acheter Hemicellulase Enzyme For Baking →](#)

## Références

---

Numérotées par ordre de première citation. Sources en libre accès, chacune vérifiée comme accessible au moment de la publication ; les numéros de citation dans le texte renvoient ici.

1. [H%C3%A9micellulose](#). *Wikipedia*.
2. [Un guide complet sur l'enzyme hémicellulase - Blog](#). *Cnadditives*.
3. [Botanique Hemicellulose 15908](#). *Futura-sciences*.
4. [Hemicellulose](#). *Aquaportail*.


### Contactez Enzymes.bio


Des questions sur une commande ? Notre équipe se fera un plaisir de vous aider.


E-MAIL [wholesale@enzymes.bio](mailto:wholesale@enzymes.bio)

TÉLÉPHONE (ÉTATS-UNIS) **+1 (507) 428-6057**

[Nous contacter →](#)

 **400+** Clients B2B

 **60+** partenaires de recherche universitaires

 **54** servis dans le monde entier

© 2026 Enzymes.bio · Fourniture d'enzymes industrielles & de transformation alimentaire · Non destiné à la consommation humaine ni à la vente au détail.