

إنزيم Invertase لإنتاج السكر المقلوب والتحكم في تبلور السكر في الأغذية والحلويات

فريق الأبحاث في Enzymes.bio · ويلينغتون، نيوزيلندا · June 21, 2026

Invertase هو إنزيم يحفز التحلل المائي للسكر إلى جلوكوز وفركتوز، لذلك يُستخدم أساسًا في إنتاج السكر المقلوب وتقليل تبلور السكر في الحلوى والشراب والحشوات. في التطبيقات الغذائية، تكمن قيمته في تعديل القوام والحلاوة والنشاط السكري داخل الوصفة دون تحويله إلى إنزيم عام لكل الكربوهيدرات. يتوفر منتج Invertase من Enzymes.bio للشراء المباشر عبر الإنترنت بوحدة 1kg، وتُرفق معه وثائق CoA و SDS مع الطلب، مع بقاء Enzymes.bio موردًا وليس جهة تصنيع أو مختبر اختبار.

ما هو Invertase ولماذا يُسمى Sucrase أو β -fructofuranosidase؟

Invertase، ويُسمى أيضًا sucrase أو saccharase أو β -fructofuranosidase، هو إنزيم من إنزيمات التحلل السكري التي تستهدف السكر. وظيفته الأساسية هي كسر الرابطة بين وحدتي الجلوكوز والفركتوز في السكر بوجود الماء، لينتج خليطًا من السكريات الأحادية يعرف صناعيًا باسم السكر المقلوب. ويُشار إليه في التصنيف الإنزيمي الشائع بالرمز EC 3.2.1.26، وهو توصيف مفيد لفهم وظيفته لكنه لا يكفي وحده لتحديد أداء كل مستحضر تجاري في كل وصفة [1].

سبب تسمية "السكر المقلوب" مرتبط بتغيير الخواص البصرية لمحلول السكر بعد التحلل، لكن الأثر الصناعي الأهم بالنسبة لمطوري المنتجات هو تغيير السلوك الفيزيائي والحسي للنظام السكري. فمزيج الجلوكوز والفركتوز يختلف عن السكر في الذوبانية، والحلاوة المدركة، والميل إلى التبلور، والقدرة على التأثير في الرطوبة والقوام، وهي خصائص تجعل invertase enzyme أداة عملية في الحلويات والشراب والمخبوزات الرطبة [2].

توجد إنزيمات Invertase في الخمائر والفطريات والنباتات وبعض البكتيريا، وقد درست الأدبيات إنتاجها من *Saccharomyces cerevisiae* و *Aspergillus spp* و *Penicillium spp*. وسلالات بكتيرية مختلفة. هذه التعددية مهمة لأنها تفسر لماذا لا تكون كل مستحضرات invertase متطابقة: فالمصدر الحيوي، وطريقة التحضير، ومستوى النقاوة، وشكل المنتج، وطبيعة الوسط النهائي كلها تؤثر في الأداء العملي، حتى عندما تكون الوظيفة العامة واحدة [3].

الوسط مناسبة لبقاء بنيته البروتينية فعالة [1].

من الناحية الوظيفية، يستهدف الإنزيم الروابط التي تتضمن جزء الفركتوفورانوز في السكروز وبعض السكريات القريبة، ولذلك تظهر في الأدبيات إشارات إلى نشاطه على ركائز مثل الرافينوز وبعض الأوليغوسكريات. لكن الرسالة العملية في الأغذية تظل واضحة: الاستخدام الأكثر مباشرة وثباتًا هو تحلل السكروز. أما التفاعلات الجانبية أو التراكمات السكرية الأكثر تعقيدًا فتتطلب تصميمًا مخصصًا للوسط والركيزة ولا ينبغي تقديمها كوظيفة مضمونة لكل منتج [7] invertase.

تخصص الإنزيم هو مصدر قوته وحدوده في الوقت نفسه. فهو ليس بديلًا عن الأميلاز في تحلل النشا، ولا عن اللاكتاز في تحلل اللاكتوز، ولا عن البروتياز في تعديل البروتينات. عند البحث عن invertase substitute يجب تحديد المشكلة: إذا كانت المشكلة هي تحلل السكروز داخل المنتج، فالبديل الحقيقي قد يكون حمضًا أو صياغيًا وليس إنزيمًا آخر يؤدي الوظيفة نفسها؛ أما إذا كانت المشكلة مجرد إضافة حلاوة أو تقليل تكلفة السكر، فقد تكون شرابات الجلوكوز أو الفركتوز أو السكر المقلوب الجاهز خيارات صياغية مختلفة وليست بدائل إنزيمية مكافئة [5].

مصادر Invertase: الخمائر والفطريات والبكتيريا

تُعد *Saccharomyces cerevisiae* من أشهر المصادر المدروسة لإنزيم Invertase، وتظهر في أبحاث متعددة تتناول إنتاج الإنزيم داخل الخلايا أو استخلاصه من خميرة الخباز. هذا الارتباط بالخميرة مهم تاريخيًا وصناعيًا، لأن الخمائر قادرة على استخدام السكروز بعد تفكيكه إلى سكريات أبسط، كما أن خميرة الخباز كانت نموذجًا عمليًا لدراسة الإنزيم وتنقيته وتطبيقه في الأغذية [8].

درست أبحاث أخرى إنتاج Invertase من *Aspergillus spp*، بما في ذلك عزل سلالات وتحسين ظروف إنتاجها وتوصيفها الجزيئي. أهمية الفطريات الخيطية في هذا السياق أنها قادرة على النمو على مخلفات زراعية أو صناعية غذائية، وقد تنتج طيفًا واسعًا من الإنزيمات خارج الخلية، ما يجعلها موضوعًا متكررًا في أبحاث التكنولوجيا الحيوية الغذائية [3].




Figure 2. 산성, 중성, 알칼리성 인버타아제는 모두 자당을 가수분해하는 기능을 공유하지만, 생물학적 맥락과 예상 작용 환경은 서로 다르다

كما تظهر *Penicillium spp*. في أبحاث حديثة عن الإنتاج بالتخمير الصلب وتثبيت الإنزيم على جسيمات نانوية مغناطيسية. هذه الدراسات لا تعني أن كل منتج تجاري يكون مثبتًا أو نانويًا، لكنها توضح اتجاهًا بحثيًا مهمًا: تحسين ثبات الإنزيم وإمكان إعادة استخدامه وتقليل فقد النشاط في ظروف المعالجة. بالنسبة للتطبيقات الغذائية المعتادة، تظل قابلية الاستخدام في الوصفة النهائية أهم من تفاصيل منصة الإنتاج البحثية [9].

وتوجد أيضًا دراسات تقارن سلالات بكتيرية مثل *Bacillus* و *Enterobacter* من زاوية رفع إنتاجية *Invertase* لاستخدامه في صناعة الأغذية. هذه الأعمال تشير إلى أن الإنزيم ليس حكرًا على الخمائر والفطريات، لكنها لا تلغي أن خصائص كل مصدر قد تختلف في الاستقرار، ونطاق الحموضة الملائم، والاستجابة لمكونات الوسط، ومدى ملاءمته لنوع التطبيق [6].

التطبيقات الغذائية الرئيسية لإنزيم *Invertase*

إنتاج السكر المقلوب والشرابات السكرية

الاستخدام الكلاسيكي لـ *Invertase* هو إنتاج السكر المقلوب من محلول سكروز. في هذه الحالة، تكون القيمة العملية في الحصول على خليط من الجلوكوز والفركتوز يمكن أن يقدم حلاوة أعلى إدراكيًا في بعض الصيغ، وذوبانية مختلفة، وميلًا أقل لتكوين بلورات سكروز خشنة. لذلك يظهر الإنزيم في سياق الشرابات والحشوات والسوائل السكرية المستخدمة في الأغذية والمشروبات [2].

في الشرابات المركزة، لا يقتصر الأمر على الحلاوة؛ فالتوازن بين السكروز المتبقي والجلوكوز والفركتوز الناتجين يؤثر في اللزوجة، وتوازن الرطوبة، والاستقرار أثناء التخزين. التحلل الجزئي قد يكون كافيًا لبعض المنتجات، بينما يحتاج منتج آخر إلى تحويل أعمق. لذلك ينبغي النظر إلى "درجة الانقلاب" كخاصية وصفية للمنتج النهائي، لا كرقم منفصل عن الإحساس الفموي والتركيب الكلي للشراب [1].

الحلويات ومراكز الشوكولاتة والفوندان

في صناعة الحلويات، يكون Invertase مفيدًا خصوصًا عندما تبدأ الوصفة بمركز سكري متماسك نسبيًا ثم يُراد له أن يصبح أكثر طراوة مع الوقت. في مراكز الشوكولاتة أو الحشوات السكرية، يمكن لتحلل السكروز التدريجي أن يغير البنية الداخلية ويزيد الليونة، مع تقليل احتمالية الإحساس الرملي الناتج عن نمو بلورات السكروز. لهذا يُعد الإنزيم جزءًا معروفًا من أدوات ضبط القوام في التطبيقات السكرية [4].

لكن هذا التطبيق يحتاج إلى توازن دقيق بين النشاط والزمن والوسط. إذا حدث التحلل بسرعة أو بعمق غير مناسب، قد يصبح المركز لينًا أكثر مما ينبغي أو يغيّر توازن الماء والهجرة الرطوبة داخل المنتج. وإذا كان الوسط غير ملائم للإنزيم، قد لا يحدث التحول بالقدر المتوقع. لذلك تكون صياغة الحلوى باستخدام invertase enzyme أقرب إلى إدارة تحول بطيء داخل المنتج، وليست مجرد إضافة مكوّن حلوة [5].




Figure 3. 과일, 꿀, 꽃가루 시스템은 인버타아제가 매개하는 자당 가수분해가 살아 있는 기질 내 당 조성을 변화시킨다는 점을 보여준다

المخبوزات والحشوات الرطبة

في المخبوزات والحشوات الرطبة، يساهم السكر المقلوب في تعديل الاحتفاظ بالرطوبة والإحساس بالليونة، خاصة في المنتجات التي تتعرض للجفاف أثناء التخزين. عندما يتحول جزء من السكروز إلى جلوكوز وفركتوز، يتغير تفاعل النظام السكري مع الماء، وقد يساعد ذلك في دعم طراوة المنتج أو ثبات الحشوة. غير أن الأثر النهائي يعتمد على الوصفة، ومرحلة إضافة الإنزيم، وظروف المعالجة الحرارية، ونوع المنتج .

من المهم هنا عدم اختزال وظيفة Invertase إلى "إطالة العمر التخزيني" بصورة عامة. الإنزيم لا يمنع كل آليات التلف، ولا يعوض وحده عن تصميم رطوبة غير مناسب أو تغليف ضعيف. قيمته في المخبوزات تكون أوضح عندما تكون المشكلة مرتبطة بسلوك السكروز والقوام والرطوبة، لا عندما تكون مرتبطة بالميكروبات أو الأكسدة أو انهيار بنية البروتين والنشا [5].

في المشروبات، يمكن أن يكون Invertase مفيدًا عند الرغبة في تحويل السكر إلى سكريات أحادية قبل المعالجة أو أثناءها، بما يغيّر الحلاوة والإحساس الفموي وتفاعل السكريات مع عمليات التخمير. وفي التطبيقات التخميرية، قد يسهل وجود الجلوكوز والفركتوز على بعض الكائنات الدقيقة استخدام السكر مقارنة بالسكر غير المتحلل، لكن ذلك يعتمد على الكائن المستخدم والمسار الإنتاجي [6].

لا ينبغي تفسير ذلك على أنه إضافة ضرورية لكل مشروب يحتوي سكر. ففي بعض المنتجات تكون ثباتية السكر مطلوبة، أو يكون التحلل الحمضي الطبيعي كافيًا، أو يكون السكر المقلوب الجاهز أكثر ملاءمة من إجراء التحول داخل العملية. لذلك يحدد هدف المنتج النهائي ما إذا كان Invertase خيارًا فعالًا أو ما إذا كان invertase substitute صياغيًا أبسط يحقق النتيجة نفسها .

مقارنة عملية: Invertase أم التحلل الحمضي أم بدائل الصياغة؟

التحلل الحمضي للسكر يمكن أن ينتج سكرًا مقلوبًا، لكنه يعتمد على ظروف كيميائية قد تؤثر في اللون والنكهة وتكوين نواتج جانبية في بعض الأنظمة. أما Invertase فيعمل بانتقائية إنزيمية أعلى نحو السكر، ما يجعله مناسبًا عندما تكون حساسية النكهة أو اللون أو المكونات الأخرى مهمة. ومع ذلك، لا يكون الإنزيم دائمًا هو الطريق الوحيد؛ ففي بعض المنتجات قد يكون شراء شراب مقلوب جاهز أو استخدام خليط سكريات بديلًا عمليًا [2].

الخيار	ما الذي يفعله عمليًا؟	نقاط القوة	القيود أو متى لا يكون مناسبًا
Invertase	يحفّز تحويل السكر داخل النظام إلى جلوكوز وفركتوز	انتقائية للسكر، مفيد للتحكم في التبلور والقوام، قابل للإدماج في وصفات الحلوى والشرابات	يعتمد على ملاءمة الوسط والزمن؛ ليس إنزيمًا عامًا لكل السكريات
التحلل الحمضي	يحوّل السكر كيميائيًا في وسط حمضي	قد يكون بسيطًا في بعض الشرابات	قد يؤثر في اللون والنكهة أو يسبب تحولات غير مرغوبة إذا لم يُضبط جيدًا
السكر المقلوب الجاهز	يضيف نواتج التحلل مباشرة دون تشغيل إنزيمي داخل الوصفة	مناسب عندما لا يلزم تحول داخلي تدريجي	لا يمنح تأثير "التحول مع الوقت" داخل مركز الحلوى
شرابات الجلوكوز/الفركتوز	تعديل الحلاوة والمواد الصلبة والرطوبة	مفيدة ك invertase substitute صياغي في بعض الحالات	ليست بديلًا آليًا إذا كان الهدف تحلل السكر الموجود بالفعل
تعديل الوصفة والتغليظ	يقلل التبلور عبر التحكم في الماء والمواد الصلبة	مهم دائمًا مع أو بدون إنزيم	قد لا يكفي وحده عند وجود حمل سكر عالٍ وميل قوي للتبلور

هذه المقارنة تساعد على وضع Invertase في مكانه الصحيح: هو أداة تحفيز حيوي متخصصة، وليس مجرد مُحلِّ أو مادة مانعة للتبلور. إذا كان الهدف تحويل السكر الموجود داخل حشوة أو شراب، يكون الإنزيم منطقيًا. أما إذا كان الهدف النهائي هو الوصول إلى ملف سكري معين منذ البداية، فقد تكون بدائل الصياغة أسرع أو أبسط، مع اختلاف واضح في النتيجة الحسية والبنوية [5].



Figure 4. 풍당 센터에서는 인버타아제가 용해된 자당을 서서히 전환시켜 더 많은 자당 결정이 녹게 하고, 시간이 지남에 따라 중심부를 더 부드럽게 만든다.

العوامل التي تتحكم في الأداء داخل الوصفة

يعتمد أداء Invertase على توافق الإنزيم مع الوسط الغذائي. الحموضة، والماء المتاح، وتركيز السكر، وتركيز المواد الصلبة، ونوع المكونات المصاحبة، وزمن التلامس كلها عوامل تؤثر في سرعة التحلل وعمقه. الإنزيمات عمومًا بروتينات حساسة؛ فإذا كان الوسط قاسيًا على البنية البروتينية أو منخفض الماء المتاح بشدة، ينخفض الأداء أو يتوقف حتى لو كان السكر موجودًا بكثرة [10].

السكر نفسه ليس مجرد ركيزة كيميائية في الأغذية، بل مكّون بنيوي يحدد اللزوجة، والصلابة، والنشاط المائي، وتفاعل المنتج مع التخزين. لذلك يؤدي تحويل السكر إلى جلوكوز وفركتوز إلى إعادة توزيع للوظائف داخل المنتج. قد تكون النتيجة المرغوبة ليونة أعلى أو تبلورًا أقل، لكنها قد تشمل أيضًا تغييرًا في الالتصاق أو الرطوبة أو الحلاوة، ما يتطلب توافقًا مع أهداف المنتج النهائية [1].

كما أن وجود مكونات أخرى قد يغير السلوك. الدهون قد تعزل جزءًا من الوسط، والهيدروكولويدات قد تغير انتقال الماء، والأحماض قد ترفع أو تخفض ملاءمة الوسط، وبعض الأملاح أو المؤكسدات قد تؤثر في ثبات البروتينات الإنزيمية. لذلك لا يكفي أن يكون المنتج "غنيًا بالسكر" كي يكون تطبيق Invertase ناجحًا؛ الأهم هو إمكانية وصول الإنزيم إلى السكر في بيئة تسمح بالنشاط [5].

الإنزيم الحر والإنزيم المثبت: ما معنى ذلك للتطبيق؟

تركز أبحاث عديدة على تثبيت Invertase على مواد حاملة، مثل الجسيمات المركبة أو المواد المسامية أو الجسيمات المغناطيسية، بهدف تحسين الثبات أو إعادة الاستخدام في عمليات مستمرة أو شبه مستمرة. التثبيت قد يقلل فقد الإنزيم، ويسهل فصله عن الوسط، ويحسن مقاومته لبعض ظروف التشغيل، لكنه يضيف اعتبارات تتعلق بانتقال الركيزة داخل الحامل والتوافق مع الغذاء^[11].

في التطبيقات الغذائية الشائعة مثل الحلوى والحشوات، يُستخدم المفهوم غالبًا بطريقة أبسط: إنزيم يوزع داخل الوصفة أو يلامس محلول السكر لتحويل السكر إلى سكر أحادي لتسهيل التحلل المطلوب. أما الأنظمة المثبتة فتكون أكثر ارتباطًا بعمليات صناعية مصممة خصيصًا أو أبحاث تطويرية. لذلك لا ينبغي الخلط بين إثبات نجاح التثبيت في دراسة علمية وبين افتراض أن كل منتج invertase تجاري يعمل بالشكل نفسه^[4].

توضح دراسات التثبيت الحديثة أيضًا أن حماية الإنزيم داخل هيكل هلامية أو حوامل معينة قد تقلل تعرضه للعوامل المثبطة وتحافظ على نشاطه لفترة أطول. هذه الفكرة مفيدة لفهم اتجاهات تطوير الإنزيمات، لكنها لا تغير القاعدة الأساسية: نجاح التحلل يعتمد على وصول السكر إلى الموقع النشط للإنزيم وعلى بقاء البنية البروتينية ملائمة للعمل^[12].



Figure 5. 인버타아제는 캔디 센터, 농축 시럽, 음료 베이스, 꿀 스타일 제품, 베이커리 필링, 자당 함유 발효 시스템 등에 활용된다

الدليل العلمي: ما هو المؤكد وما هو المشروط؟

الدليل الأقوى والأكثر مباشرة هو أن Invertase يحفز تحلل السكر إلى جلوكوز وفركتوز. هذا ليس ادعاءً تسويقيًا عامًا، بل وظيفة كيميائية حيوية راسخة تظهر في دراسات إنتاج الإنزيم وتوصيفه وتحليل تفاعل تحلل السكر. كما تناولت أبحاث حركية التفاعل والعمر العملي للنشاط والعائد التحويلي، ما يؤكد أن التحلل الإنزيمي للسكر محور علمي وصناعي واضح^[1].

توجد أدلة تطبيقية على إنتاج الإنزيم من مخلفات غذائية أو زراعية، وهو اتجاه يدعم الاستدامة والاقتصاد الدائري في التكنولوجيا الحيوية. على سبيل المثال، درست أعمال حديثة إنتاج Invertase من مخلفات الفاكهة لتحسين الكفاءة والمحافظة على الموارد، بينما بحثت أعمال أخرى نمو *Aspergillus niger* على مخلفات صناعية زراعية مع تتبع أنشطة إنزيمية متعددة [2].

الأدلة المتعلقة بالتطبيقات المتقدمة، مثل إنتاج سكريات قصيرة أو استخدامات المجسات أو أنظمة التثبيت المتخصصة، أكثر شرطية. قد تُظهر بعض إنزيمات Invertase نشاط نقل فروكتوزي أو أداءً محسّنًا بعد التثبيت، لكن ذلك لا يعني أن كل مستحضر يحقق النتائج نفسها في أي وصفة. لذلك يجب تقديم هذه الجوانب كإمكانيات تقنية مرتبطة بتصميم العملية، وليس كفوائد عامة مضمونة [7].

السلامة والتعامل المهني مع مساحيق الإنزيمات

Invertase إنزيم بروتيني يُستخدم في سياقات غذائية وصناعية، لكن المساحيق الإنزيمية المركزة ينبغي التعامل معها كمواد مهنية وليست منتجات استهلاكية مباشرة. التعرض لغبار الإنزيم أو الرذاذ المركز قد يسبب تهيجًا أو حساسية لدى بعض الأشخاص، خصوصًا عند الاستنشاق أو ملامسة العينين والأغشية المخاطية. لذلك تُستخدم ممارسات مناولة مهنية مناسبة عند فتح العبوة أو وزن المنتج أو مزجه .

تتأثر الإنزيمات بالرطوبة والحرارة والضوء والملوثات الكيميائية غير الملائمة، لأن نشاطها يعتمد على بقاء البنية البروتينية في حالة وظيفية. التخزين الجاف والمغلق وتقليل التعرض للرطوبة بعد الفتح يساعدان على الحفاظ على الأداء المتوقع. وتُعد وثيقة SDS المرفقة مع الطلب مرجعًا أساسيًا للتعامل والسلامة، بينما توضح CoA بيانات الدفعة الموردة دون أن يجعل ذلك Enzymes.bio مختبر اختبار أو جهة تصنيع .




Figure 6. 수분 가용성, 고형분 수준, 산도, 온도, 이온과 같은 기질 조건은 인버타아제 활성이 얼마나 빠르게 나타나는지에 영향을 준다

كيف يُقدّم منتج Invertase من Enzymes.bio بصورة دقيقة؟

يناسب منتج Invertase من Enzymes.bio فرق تطوير المنتجات والمصانع التي تحتاج إلى إنزيم لمعالجة السكر في الأغذية والحلويات والمشروبات والمخبوزات والمشروبات. الوصف التقني الدقيق هو أنه إنزيم لتحلل السكر وإنتاج السكر المقلوب أو ضبط سلوك السكر داخل المنتج، وليس مادة تحلية عادية ولا إنزيمًا عامًا لكل الكربوهيدرات .

Enzymes.bio مورّد B2B يتيح المنتج للشراء المباشر عبر الإنترنت بوحدة 1kg. لا ينبغي صياغة الوثيقة كما لو أن الشركة تصنع الإنزيم أو تختبره داخليًا؛ الدور المناسب هو توفير المنتج والوثائق المصاحبة للطلب، مع شرح علمي وتطبيقي يساعد المستخدم على فهم الوظيفة والحدود. وتبقى CoA و SDS جزءًا من معلومات الطلب والامتثال والسلامة .

من ناحية محركات البحث والبحث المعتمد على الذكاء الاصطناعي، أفضل صياغة لمصطلحات مثل invertase و invertase enzyme و invertase substitute هي ربطها بسياقها الفعلي: تحلل السكر، إنتاج السكر المقلوب، تقليل التبلور، وتعديل القوام والحلاوة. هذا يجعل المحتوى مفيدًا للقراء التقنيين بدل أن يكون حشدًا للكلمات المفتاحية بلا معنى [2].

الخلاصة التقنية

Invertase إنزيم متخصص يحوّل السكر إلى جلوكوز وفركتوز، وتظهر قيمته الصناعية أساسًا في إنتاج السكر المقلوب والتحكم في تبلور السكر وتعديل القوام والحلاوة في الحلويات والمشروبات وبعض تطبيقات المخبوزات والمشروبات. الأدلة الأقوى تدعم هذه الوظيفة المباشرة، بينما تبقى الاستخدامات المتقدمة مثل التثبيت أو إنتاج تراكيب سكرية خاصة مرتبطة بتصميم العملية والوسط [1].

عند استخدامه بصورة صحيحة، يكون Invertase أداة دقيقة لمعالجة السكر داخل المنتج، وليس بديلًا شاملاً عن ضبط الوصفة أو التغليف أو اختيار السكريات المناسبة. وإذا كان الهدف هو مجرد تعديل الحلاوة أو المواد الصلبة، فقد تكون بدائل الصياغة أو السكر المقلوب الجاهز أكثر ملاءمة؛ أما إذا كان الهدف تحلل السكر داخل النظام نفسه، فإن invertase enzyme يقدم مسارًا إنزيميًا متخصصًا ومثبتًا علميًا [5].

اطلب Invertase عبر الإنترنت

يُباع بوحدة 1 kg، وهو متوفر في المخزون وجاهز للشحن. اطلب مباشرة من متجرنا — ادفع عبر الإنترنت وسنعالج طلبك. تُرفق شهادة التحليل ونشرة بيانات السلامة مع كل طلب.

→ [اشتر Invertase](#)

مرقمة حسب ترتيب أول اقتباس. مصادر مفتوحة الوصول، تم التحقق من إتاحتها عند النشر؛ وترتبط أرقام الاستشهاد في النص هنا.

1. Potrich, E., & Amaral, L. S. (2018). Activation Energy, Half-Life and Yield of the Hydrolysis Reaction of Sucrose Catalyzed by the Enzyme Invertase Produced by Yeast *Saccharomyces cerevisiae*. *International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences*, 7, 806-816
2. Dokuzparmak, E. (2024). Industrial Approach to Invertase Production from Fruit Waste for Enhanced Efficiency and Conservation. *ACS Omega*, 9, 26183 - 26194
3. Salim, R., Abo-Sereh, N. A., & Khalil, B. E. (2020). Optimization and molecular characterization of novel *Aspergillus* spp. producing invertase enzyme. *Egyptian Pharmaceutical Journal*, 19, 321 - 329
4. Chouia, M., & Derouiche, S. (2025). Comparative study of immobilized enzyme on nano-composite (SCN) and free enzyme of invertase isolated from baker's yeast. *Journal of Agriculture and Applied Biology*
5. Jothyswarupha, K. A., Venkataraman, S., Rajendran, D., Shri, S., Sivaprakasam, S., Yamini, T., Karthik, P., ... et al. (2024). Immobilized enzymes: exploring its potential in food industry applications. *Food Science and Biotechnology*, 34, 1533 - 1555
6. Rana, K., Rana, N., Chauhan, N., Ghabru, A., Devi, S., & Chauhan, S. (2023). Comparative study of *Bacillus* and *Enterobacter* for upscaling of invertase production for utilization in food industry. *Journal of Food Measurement & Characterization*, 18, 1-9
7. Osiebe, O., Adewale, I. O., & Omafuvbe, B. O. (2023). Production and characterization of intracellular invertase from *Saccharomyces cerevisiae* (OL629078.1), using cassava-soybean as a cost-effective substrate. *Scientific Reports*, 13
8. Velioglu, S. D., Bağcı, U., Guner, K. G., Gulec, H. A., & Velioglu, H. M. (2025). Green Purification of Invertase from Ultrasonicated Sifted Baker's Yeast by Membrane Filtration: A Comparative Study. *Molecules*, 30
9. Bharatbhai, K., & Trivedi, S. (2024). Production of invertase from *Penicillium* spp. under solid state fermentation and its immobilization on magnetic nanoparticles. *Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences*
10. Kabir, M. F., Ovi, A. Q., & Ju, L. (2025). Real-time pH and temperature monitoring in solid-state fermentation reveals culture physiology and optimizes enzyme harvesting for tailored applications. *Microbial Cell Factories*, 24
11. Ribeiro, L. M. O., Falleiros, L. N. S. S., Resende, M. M., Ribeiro, E., Almeida, R. M., & Silva, A. O. S. (2019). Immobilization of the enzyme invertase in SBA-15 with surfaces functionalized by different organic compounds. *Journal of porous materials*, 26, 77-89
12. Wang, Z., Li, D., Yu, J., Guo, J., Zou, H., Chen, Y., & Gao, J. (2025). A Self-Assembled Amino Acid Hydrogel for Immobilization and Protection of Enzymes. *Macromolecular rapid communications*, e2401028

تواصل مع Enzymes.bio

هل لديك أسئلة حول طلب؟ يسرّ فريقنا مساعدتك.

→ تواصل معنا

الهاتف (الولايات المتحدة) +1 (507) 6057-428

البريد الإلكتروني wholesale@enzymes.bio

54 نخدم العملاء حول العالم



+60 شركاء بحثيون جامعيون



+400 عملاء B2B



© Enzymes.bio 2026 · توريد إنزيمات صناعية & لمعالجة الأغذية · غير مخصص للاستهلاك البشري أو البيع بالتجزئة.