

# Trypsine pour le traitement du cuir : enzyme de bating, assouplissement et ouverture fibreuse des peaux

Équipe de recherche Enzymes.bio · Wellington, Nouvelle-Zélande · June 19, 2026

**Leather Processing Enzyme: Trypsin Leather Softener** est une enzyme protéolytique destinée au bating — ou confitage enzymatique — des peaux après les étapes de chaulage et de déchaulage. Son intérêt technique est d'hydrolyser de façon contrôlée une partie des protéines non collagéniques et des matières inter-fibrillaires afin d'améliorer la souplesse, l'ouverture de structure et la préparation au tannage .

Enzymes.bio propose ce produit en ligne comme enzyme de traitement du cuir, vendue directement par unité de 1 kg ; le certificat d'analyse et la fiche de données de sécurité sont fournis avec la commande. Enzymes.bio agit comme fournisseur en ligne d'enzymes industrielles, sans se présenter comme fabricant ni laboratoire de développement .

## Rôle de la trypsine dans le bating du cuir

Le bating est une étape de préparation humide située après le chaulage et le déchaulage. À ce stade, la peau a déjà subi une ouverture alcaline, une élimination partielle des poils et une neutralisation progressive de l'alcalinité, mais elle contient encore des composants indésirables : protéines non structurales, fragments d'épiderme, résidus de follicules, matières inter-fibrillaires et éléments qui peuvent gêner la diffusion des agents de tannage. Une enzyme de bating à base de trypsine vise à agir sur ces fractions protéiques sans transformer le procédé en attaque généralisée du collagène .

La trypsine appartient à la famille des protéases, plus précisément des sérine-protéases. Son action repose sur l'hydrolyse de liaisons peptidiques dans les protéines, avec une spécificité reconnue vis-à-vis de certains sites contenant des acides aminés basiques. Cette sélectivité explique pourquoi la trypsine est utilisée dans des domaines très différents — biotechnologie, préparation protéique, applications industrielles — lorsque l'on recherche une coupure protéolytique contrôlée plutôt qu'une dégradation non spécifique <sup>[1]</sup>.


Dans le cuir, l'effet attendu n'est pas de « dissoudre » la peau. La matrice utile du cuir est le réseau de fibres de collagène : c'est ce réseau qui doit être conservé, ouvert et rendu plus uniforme. Le bating enzymatique cherche donc à enlever ou fragmenter des protéines accessoires qui rigidifient la

structure, retiennent des impuretés ou ralentissent la pénétration des produits ultérieurs. La littérature sur la fabrication enzymatique de cuirs souples décrit précisément l'intérêt de traitements enzymatiques pour modifier la structure d'un semi-produit cuir et améliorer sa plasticité [2].

Le positionnement du produit comme **trypsin leather softener** correspond ainsi à un usage de procédé : il sert à contribuer à la main, à la souplesse et à l'uniformité du cuir, en particulier lorsque la peau a besoin d'une ouverture fibreuse mieux maîtrisée avant tannage, retannage, teinture ou graissage. Enzymes.bio classe ce type de produit dans les enzymes industrielles pour le cuir, aux côtés d'autres familles utiles au trempage, au dégraissage, à l'épilage ou au reconditionnement .

## Mécanisme biochimique : ce que la trypsine modifie réellement dans la peau

Une peau brute ou préparée n'est pas seulement un assemblage de collagène. Elle contient un réseau complexe de protéines structurales et non structurales, de substances interfibrillaires, de résidus épidermiques, de graisses, de sels et de produits issus des étapes précédentes. Après chaulage et déchaugage, certaines de ces fractions restent associées au derme et peuvent maintenir les fibres trop serrées. La trypsine agit en hydrolysant des chaînes protéiques accessibles, ce qui réduit la cohésion de ces matières indésirables et facilite leur élimination mécanique ou aqueuse au cours du travail en bain [1].



**Figure 1.** 트립신은 접근 가능한 비콜라겐성 단백질을 선택적으로 가수분해해 콜라겐 섬유 구조는 보존하면서 가죽 원피를 부드럽게 한다.

La spécificité de la trypsine est importante pour comprendre ses avantages et ses limites. Une protéase trop agressive ou trop peu sélective peut fragiliser la surface, détériorer le grain ou provoquer une perte de résistance. À l'inverse, une protéolyse insuffisante laisse une structure trop compacte. La

trypsine est appréciée dans le bating parce qu'elle peut fournir une protéolyse modérée et ciblée, à condition que la peau, le pH, la température, le temps de contact et l'agitation soient compatibles avec le résultat recherché <sup>[3]</sup>.

Le collagène, composant principal du derme, présente une organisation particulière en triple hélice et en fibres. Cette structure explique sa résistance relative à de nombreuses protéases lorsqu'elle est intacte, mais aussi sa vulnérabilité dans les zones déjà ouvertes, gonflées, dénaturées ou mécaniquement exposées. Les travaux classiques sur la protéolyse du collagène montrent que l'attaque enzymatique dépend fortement de l'état structural du collagène, et pas seulement de la présence d'une enzyme protéolytique <sup>[4]</sup>.

Dans le bating, la différence entre une action utile et une action excessive tient donc à la diffusion. Si la trypsine agit surtout en surface, le grain peut être sur-traité tandis que les couches internes restent moins ouvertes. Si l'action est plus régulière, la peau devient plus souple et mieux préparée aux opérations suivantes. Des recherches récentes sur la modulation de la résistance des protéines de peau à l'hydrolyse enzymatique soulignent justement l'importance du contrôle de la réaction pour obtenir un cuir de qualité, notamment dans les procédés assistés par enzymes <sup>[5]</sup>.

## Effets recherchés sur la qualité du cuir

---

Le premier effet recherché est l'assouplissement. En retirant une partie des protéines non collagéniques et des matières qui remplissent les espaces entre fibres, la trypsine facilite le mouvement relatif des faisceaux de collagène. Le cuir peut alors présenter une main plus souple, une flexion plus agréable et une sensation moins « cartonnée ». Les travaux sur l'amélioration de cuirs souples par plasticisation enzymatique vont dans ce sens : l'intérêt du traitement enzymatique est de modifier la structure du semi-produit pour améliorer la souplesse finale <sup>[2]</sup>.

Le deuxième effet est l'ouverture fibreuse. Une structure trop fermée ralentit la pénétration des agents de tannage, de retannage, de teinture et de graissage. Le bating enzymatique contribue à rendre le derme plus accessible, ce qui peut favoriser une distribution plus homogène des produits chimiques ultérieurs. Cette ouverture ne doit cependant pas être confondue avec un affaiblissement : le bon équilibre consiste à augmenter l'accessibilité sans dégrader la résistance utile du réseau collagénique <sup>[5]</sup>.

Le troisième effet concerne le grain. Une peau mal préparée peut donner un grain irrégulier, chargé, rugueux ou insuffisamment net. Une protéolyse maîtrisée aide à éliminer certains résidus de surface et à améliorer la propreté de la fleur. En revanche, une action trop intense peut produire l'effet inverse :

relâchement excessif, dommages superficiels ou perte de définition. C'est pourquoi la trypsine doit être comprise comme un outil de précision, pas comme une correction universelle de tous les défauts de préparation [4].




Figure 2. 제어된 베이팅 공정은 섬유 사이 물질을 느슨하게 하여 콜라겐 다발이 더 잘 분리되고 자유롭게 움직이도록 한다.

Le quatrième effet est la reproductibilité du procédé. Les enzymes sont des biocatalyseurs : elles accélèrent des réactions ciblées dans des conditions données. Dans une tannerie, cela permet de remplacer une partie de l'effet empirique de traitements plus agressifs par une action plus sélective, sous réserve que les paramètres de procédé soient maîtrisés. Les revues sur les enzymes microbiennes et industrielles soulignent l'intérêt général des enzymes pour des applications de transformation où la sélectivité réactionnelle est recherchée [6].

## Comparaison avec d'autres enzymes utilisées en tannerie

La trypsine n'est pas la seule enzyme pertinente dans le traitement du cuir. Elle appartient à une famille plus large de protéases, mais d'autres enzymes ont des cibles différentes : kératinases pour les structures riches en kératine, lipases pour les graisses, protéases acides ou alcalines selon les fenêtres de pH et les étapes de procédé. Le choix dépend de l'opération visée : bating, trempage, épilage enzymatique, dégraissage, reconditionnement ou préparation au tannage .

| Famille enzymatique                          | Cible principale dans la peau  | Étape typique du procédé cuir                      | Effet industriel recherché                                     | Point de vigilance   |
|--|--|--|--|--|
| Trypsine / protéase de bating                | Protéines non collagéniques accessibles, matières inter-fibrillaires | Bating après déchaulage                            | Souplesse, ouverture fibreuse, préparation au tannage          | Sur-action possible si la diffusion et le temps ne sont pas maîtrisés [5]  |
| Kératinases                                  | Kératine des poils, racines et structures associées                  | Épilage ou assistance à l'épilage                  | Réduction de la dépendance aux traitements chimiques d'épilage | Doit être adaptée à la kératine sans endommager excessivement le derme [7] |
| Protéases générales industrielles            | Protéines variées selon spécificité et conditions                    | Trempage, bating, nettoyage protéique              | Hydrolyse ciblée de fractions protéiques                       | Sélectivité variable selon enzyme et procédé [6]                           |
| Lipases                                      | Triglycérides et graisses naturelles                                 | Dégraissage, peaux grasses, wet-blue selon procédé | Amélioration de la propreté grasse et de la pénétration        | Ne remplace pas une protéase de bating pour les protéines                  |
| Systèmes enzymatiques encapsulés ou formulés | Substrats ciblés selon enzyme intégrée                               | Épilage, assouplissement ou procédés combinés      | Meilleure maîtrise de la libération et de l'action enzymatique | La performance dépend fortement du système et du support [8]               |

Les kératinases illustrent bien cette distinction. Elles sont étudiées pour dégrader la kératine, une protéine très résistante présente notamment dans les poils, plumes et structures kératinisées. Dans le cuir, elles intéressent surtout les procédés d'épilage plus propres ou d'assistance à l'épilage, mais leur cible n'est pas la même que celle d'une trypsine de bating destinée à l'assouplissement du derme déchaulé [7].

Les approches plus récentes incluent aussi des systèmes de protéases encapsulées. Une étude sur des liposomes contenant des protéases présente ce type de formulation comme une voie pour obtenir à la fois un épilage plus vert et une production de cuir souple. Ce type de recherche montre que le contrôle spatial et temporel de l'activité enzymatique devient un sujet important dans le cuir, précisément parce qu'une protéase efficace doit agir au bon endroit et au bon moment [8].

## Conditions générales d'intégration dans un procédé de cuir

Dans un procédé classique, Leather Processing Enzyme: Trypsin Leather Softener s'insère après les étapes de trempage, chaulage, épilage éventuel et déchaulage. Le déchaulage prépare la peau à une action enzymatique plus régulière en réduisant l'alcalinité excessive et en rendant les tissus plus compatibles avec le bating. Le produit est donc à considérer comme une enzyme de traitement humide, destinée à être intégrée dans une conduite de tannerie existante plutôt qu'utilisée isolément .

La performance dépend de l'état de la peau. Une peau insuffisamment réhydratée, trop gonflée, mal déchaulée ou hétérogène en épaisseur ne réagira pas de la même façon qu'une peau préparée de manière régulière. L'enzyme ne compense pas entièrement les défauts des opérations amont. Elle agit sur les substrats accessibles ; si les protéines visées ne sont pas accessibles ou si la diffusion est limitée, l'action restera partielle [5].



Figure 3. 트립신 베이팅은 석회 처리와 탈회 처리 후, 산침·무두질·무두질 후 공정 전에 이루어진다.

Le temps de traitement est un facteur critique. Une exposition insuffisante peut ne pas enlever assez de matières inter-fibrillaires ; une exposition excessive peut réduire la fermeté, affecter la fleur ou compromettre certaines propriétés mécaniques. La littérature sur la protéolyse du collagène rappelle que la susceptibilité à l'attaque enzymatique augmente lorsque la structure est ouverte ou modifiée, ce qui justifie une attention particulière aux peaux fines, fragiles ou déjà fortement traitées [4].

L'agitation et le rapport bain-peau influencent également la régularité. En foulon ou en paddle, l'objectif est de favoriser le contact enzyme-substrat sans créer une abrasion excessive. Une action mécanique bien conduite aide à distribuer l'enzyme et à évacuer les fragments hydrolysés. À l'inverse,


une répartition inégale peut provoquer des zones sur-traitées et sous-traitées dans le même lot [2].

La température et le pH doivent rester compatibles avec la trypsine et avec la qualité du cuir visée. Sans entrer dans des valeurs opératoires spécifiques, le principe est simple : une enzyme possède une fenêtre d'activité, et sortir de cette fenêtre réduit l'efficacité ou augmente le risque de réactions non désirées. Les travaux sur la production et la stabilité de la trypsine montrent que l'activité de cette enzyme dépend de son environnement moléculaire et des conditions auxquelles elle est exposée [3].

## Avantages techniques raisonnables d'un assouplissant à base de trypsine

Le principal avantage est la sélectivité relative. Par rapport à une attaque chimique plus générale, une protéase agit sur des liaisons peptidiques et sur des substrats protéiques accessibles. Dans le cadre du bating, cette sélectivité peut permettre de réduire certaines matières indésirables tout en conservant l'architecture collagénique utile. C'est l'une des raisons pour lesquelles les enzymes sont largement étudiées dans les industries de transformation [6].

Un autre avantage est l'amélioration potentielle de la pénétration des produits ultérieurs. Lorsque les matières inter-fibrillaires sont réduites, les agents de tannage, de retannage, de teinture et de graissage rencontrent une structure moins obstruée. L'effet peut se traduire par une meilleure uniformité de main, une répartition plus homogène des produits de finition humide et une diminution de certaines irrégularités liées à une peau trop fermée [2].



**Figure 4.** 가죽용 프로테아제는 적용 공정 단계, 주된 기질, 작용 강도, 주의점이 서로 다르며, 트립신은 제어된 베이팅용 프로테아제로 자리매김한다.

La trypsine peut aussi contribuer à une qualité plus constante lorsque le procédé est stabilisé. Dans un cadre industriel, la répétabilité ne vient pas seulement du produit enzymatique, mais de l'ensemble peau-procédé-machine. Cependant, une enzyme bien intégrée peut rendre l'étape de bating plus contrôlable qu'un assouplissement reposant uniquement sur des traitements mécaniques ou chimiques peu sélectifs [5].

Enfin, les enzymes s'inscrivent dans une tendance de procédés cuir plus ciblés. Les recherches sur les kératinases, les protéases encapsulées et les technologies enzymatiques montrent un intérêt croissant pour des solutions qui réduisent l'intensité de certaines opérations chimiques, notamment l'épilage et l'assouplissement. Cette orientation ne signifie pas que l'enzyme rend le cuir « sans impact », mais qu'elle peut contribuer à une meilleure précision de procédé [8].

## Limites, risques de surtraitement et points de maîtrise

---

La première limite est le risque d'action superficielle. Si la trypsine hydrolyse rapidement les protéines accessibles en surface mais diffuse lentement dans l'épaisseur, la fleur peut être davantage attaquée que les couches internes. Ce déséquilibre peut réduire la qualité du grain ou créer une main irrégulière. Les recherches récentes sur l'assistance enzymatique dans le cuir soulignent que la modulation de la résistance des protéines de peau à l'hydrolyse est essentielle pour maintenir une qualité élevée [5].

La deuxième limite concerne la variabilité des peaux. Les peaux bovines, ovines ou caprines ne présentent pas la même densité fibreuse, la même épaisseur, la même teneur en graisses ni la même sensibilité mécanique. Même au sein d'une même espèce, la partie de la peau, l'âge, la conservation et les opérations amont influencent la réponse au bating. Une même enzyme peut donc produire des résultats différents selon la matière première [2].

La troisième limite est la confusion entre assouplissement et déstructuration. Un cuir très souple n'est pas nécessairement un cuir de meilleure qualité si la résistance, le grain ou la tenue sont compromis. Le bating doit viser une ouverture contrôlée, non un relâchement excessif. Les travaux sur la protéolyse du collagène rappellent que les protéines structurales peuvent devenir plus vulnérables lorsque leur organisation est altérée [4].

La quatrième limite est le choix de la bonne famille enzymatique. Une trypsine de bating n'est pas une lipase de dégraissage, ni une kératinase d'épilage. Si le problème principal d'un lot est un excès de graisse naturelle, une enzyme protéolytique ne ciblera pas directement les triglycérides. Si le problème principal est la kératine résiduelle, une stratégie impliquant des kératinases peut être plus pertinente dans les étapes adaptées [7].




Figure 5. 효소가 균일하게 침투하면 표면의 과처리를 피하면서 원피 단면 전체의 섬유 풀림을 개선하는 데 도움이 된다.

## Place de la trypsine dans une fabrication du cuir plus responsable

L'industrie du cuir cherche depuis longtemps à réduire la charge chimique, la pollution des effluents et les pertes de matière tout en maintenant les performances du produit fini. Les enzymes sont étudiées dans ce contexte parce qu'elles peuvent réaliser des réactions ciblées dans des conditions plus douces que certains traitements conventionnels. Les revues sur les enzymes microbiennes et leurs applications industrielles décrivent cet intérêt général pour des biocatalyseurs capables d'améliorer l'efficacité de procédés variés [6].

Dans le cuir, les efforts portent notamment sur l'épilage enzymatique, le bating contrôlé, le dégraissage et la valorisation de sous-produits. Les kératinases sont étudiées pour réduire la dépendance à certains traitements agressifs d'élimination des poils, tandis que les protéases peuvent contribuer à des étapes d'ouverture et d'assouplissement. Les revues récentes sur les kératinases confirment l'importance de ces enzymes dans les applications industrielles liées aux matières kératiniques [9].

La durabilité ne dépend toutefois pas d'une seule enzyme. Elle dépend du procédé complet : origine des peaux, conservation, consommation d'eau, chaulage, déchaulage, tannage, retannage, teinture, graissage, traitement des effluents et gestion des déchets. Les recherches sur des technologies de tannage plus propres, y compris les alternatives sans chrome ou les agents issus de ressources recyclées, montrent que l'amélioration environnementale du cuir est multifactorielle [10].

Il est donc plus juste de présenter Leather Processing Enzyme: Trypsin Leather Softener comme un levier de précision dans l'étape de bating. Utilisée correctement, la trypsine peut aider à réduire certaines contraintes de préparation et à améliorer l'efficacité de l'ouverture fibreuse. Elle ne remplace pas la maîtrise globale du procédé, mais elle peut s'intégrer dans une stratégie plus sobre et mieux contrôlée .

## Positionnement Enzymes.bio et format de vente

Enzymes.bio fournit Leather Processing Enzyme: Trypsin Leather Softener comme enzyme industrielle pour le traitement du cuir, avec achat en ligne par unité de 1 kg. Le produit s'adresse aux utilisateurs industriels, ateliers de transformation et professionnels du cuir qui souhaitent intégrer une enzyme de bating à base de trypsine dans leur procédé humide. Le certificat d'analyse et la fiche de données de sécurité sont fournis avec la commande .

Il est important de distinguer le rôle du fournisseur du rôle d'un fabricant ou d'un laboratoire d'essais. Enzymes.bio met à disposition des enzymes industrielles via une plateforme de vente en ligne et une catégorie dédiée aux enzymes de traitement du cuir ; la conduite du procédé, les essais internes de tannerie et la validation sur les peaux traitées relèvent de l'utilisateur industriel et de son environnement de production .



**Figure 6.** 트립신 베이팅은 부드러움, 더 깨끗한 은면 촉감, 더 균일한 처리액 이동, 그리고 무두질·염색·재무두질·가지 처리 준비성 향상에 기여한다.

Dans cette logique, le produit doit être évalué comme un ingrédient de procédé. Son intérêt dépend du type de peau, du niveau d'ouverture recherché, du cuir final visé et de la compatibilité avec les opérations avant et après bating. La valeur ajoutée principale est l'action protéolytique contrôlée de la

trypsine sur les composants protéiques indésirables, au service d'une meilleure souplesse et d'une préparation plus régulière au tannage [1].

## Synthèse technique

---

Leather Processing Enzyme: Trypsin Leather Softener est une protéase de bating destinée à l'assouplissement enzymatique des peaux déchaulées. Son mécanisme repose sur l'hydrolyse de protéines accessibles qui ne constituent pas la charpente collagénique principale, ce qui favorise l'élimination de matières inter-fibrillaires, l'ouverture du réseau fibreux et une meilleure préparation aux étapes de tannage et post-tannage .

La trypsine est utile parce qu'elle combine une activité protéolytique reconnue avec une spécificité qui peut être exploitée pour un bating modéré. Mais cette efficacité exige une conduite maîtrisée : diffusion dans l'épaisseur, état de la peau, durée, agitation, pH et température influencent directement le résultat. Une action trop superficielle ou trop prolongée peut affecter le grain ou la résistance, tandis qu'une action bien intégrée améliore la souplesse et l'uniformité [5].

Par rapport aux autres enzymes de tannerie, la trypsine se situe principalement dans le domaine du bating et de l'assouplissement. Les kératinases ciblent plutôt les structures kératiniques liées aux poils, les lipases ciblent les graisses, et d'autres protéases peuvent être adaptées à des fenêtres de procédé différentes. Le choix de l'enzyme doit donc correspondre à l'étape technique et au défaut à corriger, non à une logique générique d'« enzyme pour cuir » [7].

Pour les utilisateurs industriels, ce produit représente un outil de précision pour obtenir un cuir plus souple, plus ouvert et mieux préparé aux opérations ultérieures. Enzymes.bio le propose en ligne par unité de 1 kg, avec CoA et SDS fournis avec la commande, dans le cadre de sa gamme d'enzymes industrielles pour le traitement du cuir .

### **Commander Leather Processing Enzyme: Trypsin Leather Softener en ligne**

Vendu par unité de 1 kg, en stock et prêt à expédier. Commandez directement sur notre boutique — payez en ligne et nous traitons votre commande. Un certificat d'analyse et une fiche de données de sécurité sont inclus avec chaque commande.

[Acheter Leather Processing Enzyme: Trypsin Leather Softener →](#)

## Références

Numérotées par ordre de première citation. Sources en libre accès, chacune vérifiée comme accessible au moment de la publication ; les numéros de citation dans le texte renvoient ici.

1. Matinfar, A., Dezfulian, M., Haghighipour, N., Kurdtabar, M., & Pourbabaei, A. (2022). Replacement of Trypsin by Proteases for Medical Applications. *Iranian journal of pharmaceutical research*, 21.
2. Danylkovych, A., & Lishchuk, V. (2016). An improvement of the technology of manufacturing supple leather through enzymatic plasticizing of a structured semi-finished product. *Eastern-European Journal of Enterprise Technologies*, 4, 18-22.
3. Zhang, Y., Huang, H., Yao, X., Du, G., Chen, J., & Kang, Z. (2018). High-yield secretory production of stable, active trypsin through engineering of the N-terminal peptide and self-degradation sites in Pichia pastoris. *Bioresource Technology*, 247, 81-87 .
4. Green, G. H. (1957). Proteolysis of Collagen. *Nature*, 180, 93-93.
5. Liu, H., Chen, X., Kang, J., Shi, B., & Zeng, Y. (2025). Modulation of hide protein resistance to enzymatic hydrolysis by calcium ions: rational design of enzyme-assisted unhairing for high-quality leather production. *Collagen and Leather*, 7.
6. Vermelho, A. B., Supuran, C., & Guisán, J. (2012). Microbial Enzyme: Applications in Industry and in Bioremediation. *Enzyme Research*, 2012.
7. Gahatraj, I., Borah, A., Pandey, P., Bhattacharya, A., Mazumdar, S., Singh, B., & Kumar, S. (2023). Current Progress and Biotechnological Applications of Microbial Keratinases. *Journal of Pure and Applied Microbiology*.
8. Arunachalam, B., Dhathathreya, A., & Palanisamy, T. (2025). Protease encapsulated liposomes for twin benefits: a green approach to unhairing and soft leather production. *Journal of liposome research*, 35, 370 - 381.
9. Mazhar, S., Qurashi, A., Latif, T., & Noor, S. (2023). Production and Applications of Keratinases in Industry. *Pakistan Journal of Biochemistry and Biotechnology*.
10. Hao, D., Wang, X., Liang, S., Yue, O., Liu, X., Hao, D., & Dang, X. (2023). Sustainable leather making - An amphoteric organic chrome-free tanning agents based on recycling waste leather. *Science of the Total Environment*, 161531 .

### Contacteur Enzymes.bio

Des questions sur une commande ? Notre équipe se fera un plaisir de vous aider.

E-MAIL [wholesale@enzymes.bio](mailto:wholesale@enzymes.bio)

TÉLÉPHONE (ÉTATS-UNIS) **+1 (507) 428-6057**

[Nous contacter →](#)



**400+** Clients B2B



**60+** partenaires de recherche universitaires



**54** servis dans le monde entier

© 2026 Enzymes.bio · Fourniture d'enzymes industrielles & de transformation alimentaire · Non destiné à la consommation humaine ni à la vente au détail.