

# Thermostable Alpha Amylase للتخمير عالي العائد: تسييل النشا وخفض اللزوجة قبل السكّرة والتخمير

فريق الأبحاث في Enzymes.bio · ويلينغتون، نيوزيلندا · June 21, 2026

**الإجابة المباشرة:** Thermostable Alpha Amylase هو إنزيم ألفا-أميليز مقاوم للحرارة يُستخدم أساسًا لتسييل النشا في الهريس أو المعلّقات النشوية الساخنة، عبر قطع روابط  $\alpha$ -1,4 داخل سلاسل الأميلوز والأميلوبكتين وتحويلها إلى ديكستريونات وسكريات أقصر. في التخمير عالي العائد، تكمن قيمته في خفض اللزوجة وتحسين إتاحة الكربوهيدرات للسكّرة اللاحقة والكائنات المخمّرة، لا في ضمان عائد نهائي مستقل عن بقية العملية <sup>[1]</sup>.

## ما هو Thermostable Alpha Amylase ولماذا يهم في التخمير؟

Thermostable Alpha Amylase هو ألفا-أميليز مختار أو مطوّر ليحافظ على وظيفته في مراحل معالجة أكثر سخونة من الظروف المعتدلة، وهي خاصية مهمة في خطوط تحويل النشا التي تمر عادةً بجلتنة وتسييل قبل السكّرة والتخمير. تعمل ألفا-أميليز عمومًا كإنزيمات داخلية القطع؛ أي إنها لا تبدأ من طرف السلسلة فقط، بل تقطع روابط  $\alpha$ -1,4 داخل عديدات السكاريد النشوية، فتُقصّر السلاسل الطويلة وتحوّل الوسط من عجينة لزجة إلى نظام أكثر قابلية للخلط والضح والتحويل الإنزيمي اللاحق <sup>[1]</sup>.

في سياق "High Yield Fermentation"، لا يعني الاسم أن الإنزيم وحده يرفع العائد في كل نظام، بل يعني أنه يخدم خطوة حاسمة ضمن سلسلة إنتاج العائد: تحويل النشا غير القابل للتخمير المباشر إلى ركائز وسيطة يسهل تحويلها إلى سكريات قابلة للتخمير. وقد أظهرت دراسات التخمير عالية العائد في ركائز متنوعة أن الأداء النهائي يتأثر بتكامل المعالجة الأولية، والتحلل الإنزيمي، وتركيز المواد الصلبة، واستراتيجية التغذية، وسلالة الكائن المخمّر، وليس بعامل واحد منفرد <sup>[2]</sup>.


بالنسبة إلى Enzymes.bio، يُعرض Thermostable Alpha Amylase كمنتج إنزيمي للاستخدام المهني والصناعي والبحثي، مع الشراء المباشر عبر الإنترنت بوحدة 1 kg. Enzymes.bio. موّرد وليس جهة تصنيع أو مختبر اختبار، وُثِرْفَق وثائق المنتج مثل CoA و SDS مع الطلب لدعم الاستخدام المنظم ضمن بيئة مهنية مناسبة.

## آلية العمل: كيف يغيّر الإنزيم بنية النشا؟

النشا يتكون أساسًا من الأميلوز، وهو سلاسل خطية غالبًا بروابط  $\alpha$ -1,4، والأميلوبكتين، وهو بوليمر متفرع يحتوي روابط  $\alpha$ -1,4 على امتداد السلاسل وروابط  $\alpha$ -1,6 عند نقاط التفرع. Thermostable Alpha Amylase يستهدف بالدرجة الأولى روابط  $\alpha$ -1,4 الداخلية، لذلك يُنتج مزيجًا من الديكستريونات والمالتوس والمالتوتريوز وسكريات

قصيرة أخرى بحسب نوع النشا ودرجة الجلتنة وتكامل الإنزيمات المرافقة [3].

هذه الآلية مهمة لأن خفض الطول الجزيئي للسلاسل يقلل تشابكها وقدرتها على رفع اللزوجة. في الهريس النشوي عالي المواد الصلبة، قد يؤدي النشا المجلتن إلى مقاومة عالية للخلط وانتقال الحرارة، بينما يؤدي القطع الداخلي بواسطة ألفا-أميليز إلى تقليل حجم البوليمرات وتسهيل حركة الماء والإنزيمات الأخرى داخل الوسط. لذلك تُستخدم الأشكال المقاومة للحرارة خصوصًا عندما تكون المعالجة الحرارية جزءًا من فتح حبيبات النشا وإتاحتها للتحلل [1].



**Figure 1.** 내열성 알파-아밀레이스는 발효에 앞서 전분 내부의  $\alpha$ -1,4 결합을 절단해 더 짧은 덱스트린을 형성한다

مع ذلك، لا ينبغي اعتبار ألفا-أميليز بديلًا كاملًا عن إنزيمات السكرّة النهائية. لأنها لا تُصمم عادةً لإزالة كل نقاط التفرع  $\alpha$ -1,6 ولا لتحويل جميع الديكستريانات إلى جلوكوز حر، فإنها تعمل غالبًا قبل أو مع إنزيمات مثل الجلوكوأميليز أو إنزيمات إزالة التفرع عندما يكون الهدف إنتاج سكريات قابلة للتخمير بكفاءة أعلى. هذا يفسر لماذا يكون دورها محوريًا في التسييل، بينما يعتمد اكتمال التحويل السكري على منظومة إنزيمية أوسع [4].

## لماذا الصفة "مقاومة للحرارة" ذات قيمة صناعية؟


تتعرض ركائز النشا في كثير من العمليات إلى تسخين مقصود لتسهيل الجلتنة وفتح البنية الحبيبية. الإنزيم غير المستقر حراريًا قد يفقد جزءًا كبيرًا من فاعليته في هذه المرحلة، ما يفرض تبريدًا مبكرًا أو يحد من كفاءة التسييل. أما Thermostable Alpha Amylase فيسمح بربط المعالجة الحرارية بالتحلل الإنزيمي بصورة أكثر سلاسة، بحيث يبدأ تقصير السلاسل عندما تكون الحبيبات النشوية أكثر انفتاحًا وقابلية للهجوم الإنزيمي [1].

تدعم الأدبيات الحديثة البحث عن ألفا-أميليز حرارية من بيئات وميكروبات قادرة على تحمل ظروف قاسية نسبيًا. فالدراسات الميتاجينومية في الينابيع الحرارية، على سبيل المثال، تُستخدم لاكتشاف جينات ألفا-أميليز مستقرة حراريًا، لأن البيئات الساخنة تمثل مصدرًا منطقيًا لإنزيمات ذات بنى بروتينية أكثر قدرة على الحفاظ على الطي

كما أن عزل بكتيريا منتجة للأميليز من بيئات غنية بالتحلل العضوي أو الحرارة، مثل مصانع الكومبوست، يوضح اتجاهًا بحثيًا عمليًا: العثور على سلالات تنتج أميليز يحتمل أن يناسب المعالجة الصناعية التي تحتاج ثباتًا أعلى. هذه الدراسات لا تعني أن كل منتج تجاري يتطابق مع السلالة المنشورة، لكنها تؤكد الأساس العلمي لفكرة الأميليز الحراري في التطبيقات الصناعية [6].

## دور الإنزيم في سلسلة التخمير عالي العائد

في عملية تخمير تعتمد على النشا، يمكن النظر إلى Thermostable Alpha Amylase كحلقة أولى في سلسلة تحرير الكربوهيدرات. يبدأ المسار عادةً بمادة خام نشوية مثل الذرة أو القمح أو الأرز أو الكسافا أو البطاطس أو مخلفات غنية بالنشا، ثم تُعالج حراريًا ومائيًا لفتح الحبيبات، ثم يتدخل ألفا-أميليز لتسييل الوسط وتحويل البوليمرات الطويلة إلى ديكستريانات قابلة للسكّرة [7].



**Figure 2.** 젤라틴화된 긴 전분 사슬을 더 짧은 조각으로 절단하면 매시의 높은 점도를 유발하는 얽힌 고분자 네트워크가 줄어든다

بعد التسييل، تحتاج العملية إلى تحويل أعمق للديكستريانات إلى سكريات يستطيع الكائن المخمر استهلاكها. في إنتاج الإيثانول، مثلاً، يكون الجلوكوز والسكريات القصيرة القابلة للاستقلاب هي الركائز المباشرة للخمائر أو الكائنات المستخدمة، بينما لا يكون النشا الخام مناسباً للتخمير المباشر في معظم التصاميم التقليدية. لذلك فإن مساهمة Thermostable Alpha Amylase في العائد تكون غير مباشرة لكنها أساسية: رفع قابلية الركيزة للتحويل وتقليل العوائق الفيزيائية قبل مرحلة التخمير [8].

هذا المنطق يظهر أيضاً في دراسات لا تعتمد بالضرورة على النشا النقي، بل على مواد نباتية معقدة أو عالية المواد الصلبة؛ إذ يتكرر مبدأ أن العائد يتحسن عندما تتكامل المعالجة الأولية والتحلل الإنزيمي والتخمير في تصميم واحد. في إنتاج حمض السكسينيك من تفل قصب السكر، مثلاً، رُبِطت المعالجة المائية الساخنة والتحلل

الإنزيمي عالي المواد الصلبة والتخمير المتدرج ضمن مسار واحد لتحسين استغلال الكربوهيدرات [9].

## مقارنة وظيفية بين Thermostable Alpha Amylase والإنزيمات المرافقة


لا يعمل Thermostable Alpha Amylase في فراغ؛ ففي كثير من خطوط التخمير يكون جزءًا من "نظام إنزيمي" يوزع المهام بين التسييل والسكرّة وإزالة التفرعات وتحلل الألياف أو البروتينات المصاحبة. يوضح الجدول التالي موقعه الوظيفي مقارنةً بإنزيمات أخرى قد تظهر في عمليات تحويل المواد الزراعية والنشوية [4].

المكوّن الإنزيمي	الهدف الجزيئي الرئيسي	الدور العملي في التخمير	ما لا ينجزه وحده عادةً
Thermostable Alpha Amylase	روابط $\alpha$ -1,4 الداخلية في النشا	تسييل الهريس، خفض اللزوجة، إنتاج ديكستريانات وسكريات قصيرة	لا يضمن تحويلًا كاملًا إلى جلوكوز ولا يزيل كل التفرعات
Glucoamylase	أطراف الديكستريانات وروابط قابلة للتحلل تدريجيًا	زيادة الجلوكوز القابل للتخمير بعد التسييل	لا يكون مثاليًا وحده مع هريس شديد اللزوجة قبل التسييل
Pullulanase أو إنزيمات إزالة التفرع	روابط $\alpha$ -1,6 عند نقاط التفرع	فتح الأميلوبكتين والديكستريانات الحديّة لتحسين السكرّة	لا تقوم عادةً بدور التسييل السريع للسلاسل الطويلة
Cellulase / Hemicellulase	السليولوز والهيميسليولوز في المواد النباتية	تحرير سكريات من الألياف في ركائز غير نقية أو مخلفات زراعية	لا تستهدف النشا كوظيفة رئيسية
Protease	البروتينات المصاحبة في بعض الحبوب أو المخلفات	تحسين تحرير المغذيات أو تعديل اللزوجة والبنية بحسب الركيزة	لا يحول النشا إلى سكريات

هذه المقارنة مهمة خصوصًا عند استخدام مواد خام غير نقية. فالحبوب الكاملة والمخلفات الزراعية لا تحتوي نشا فقط، بل تضم بروتينات وأليافًا ودهونًا ومعادن ومركبات فينولية أحيانًا. لذلك قد يحقق ألفا-أميليز تأثيرًا واضحًا على اللزوجة والنشا، بينما يبقى العائد النهائي مشروطًا بإنزيمات أخرى وبقدرة الكائن المخمّر على التعامل مع الوسط الناتج [10].

## ما الذي يحدث داخل الهريس النشوي؟

عند تسخين النشا في الماء، تنتفخ الحبيبات وتفقد جزءًا من انتظامها البلوري، فيصبح البوليمر أكثر تعرضًا للماء والإنزيم. هذه الجلتنة تزيد قابلية التحلل لكنها ترفع اللزوجة في الوقت نفسه. عندما يُضاف Thermostable Alpha Amylase في مرحلة مناسبة من المعالجة، يبدأ في تقطيع السلاسل الممدودة حديثًا، فيمنع تراكم شبكة بوليمرية كثيفة ويحوّل الهريس إلى سائل أو معلق أقل مقاومة للحركة [3].



**Figure 3.** 내열성 알파-아밀레이스는 고온 전분 처리 조건에서도 유용한 접힌 구조를 더 오래 유지한다

من الناحية العملية، يؤدي هذا إلى ثلاث نتائج مترابطة: أولاً، يتحسن الخلط وتوزيع الحرارة داخل الخزان؛ ثانيًا، تصبح الديكستريانات الناتجة أكثر قابلية للوصول بواسطة إنزيمات السكرّة؛ وثالثًا، تقل احتمالات وجود كتل نشوية غير معالجة تحجز الكربوهيدرات بعيدًا عن الإنزيمات والكائنات المخمرة. هذه النتائج لا تُقاس فقط بكمية السكريات النهائية، بل أيضًا باستقرار التشغيل وسهولة ضخ الهريس وتجانس التحويل <sup>[1]</sup>.


تختلف الاستجابة حسب مصدر النشا. فنشا الذرة والقمح والأرز والدرنات لا يتصرف بالطريقة نفسها؛ إذ تختلف نسبة الأميلوز إلى الأميلوبكتين، وحجم الحبيبات، ودرجة الارتباط بالبروتينات أو الليبيدات، وسلوك الانتفاخ. لذلك قد يعطي الإنزيم نفسه أداءً مختلفًا بين ركائز متعددة، حتى لو كانت جميعها "مواد نشوية" من منظور عام <sup>[11]</sup>.

## العلاقة بين الثبات الحراري والبنية البروتينية

الثبات الحراري في الأميليز ليس صفة غامضة، بل يرتبط ببنية البروتين وقدرته على الحفاظ على موقعه النشط وشكله الثلاثي أثناء التعرض للحرارة. تشير مراجعات الأميليز الحرارية إلى أن مصادرها الميكروبية، خاصة الكائنات المحبة للحرارة أو المتكيفة مع بيئات قاسية، توفر إنزيمات ذات توازن أفضل بين المرونة اللازمة للتكيف والصلابة اللازمة لمنع التفكك الحراري <sup>[1]</sup>.

تُظهر دراسات على ألفا-أميليز من أجناس مثل *Bacillus* و *Geobacillus* و *Streptomyces* أن الاختلاف في المصدر الحيوي يؤثر في خصائص مثل تحمل الحرارة، والعمل على النشا الخام أو المجلتن، والاستقرار في أوساط مختلفة. وقد استُخدمت ألفا-أميليز مؤتلفة من *Geobacillus*، على سبيل المثال، في تطبيقات تتعلق بإنتاج النشا المسامي، ما يبرز قابلية هذه الفئة للعمل على بنى نشوية بطريقة تطبيقية <sup>[3]</sup>.

كما أن بعض العوامل التركيبية قد تدعم ثبات ألفا-أميليز، ومنها ارتباط أيونات معدنية في مواقع تساعد على تثبيت الطي البروتيني. تشير دراسة عن تعديل ثبات وكفاءة ألفا-أميليز إلى أن الكالسيوم يمكن أن يؤثر في الاستقرار والتحفيز في أنظمة معينة، لكن هذا لا يعني أن كل منتج أو كل عملية تحتاج الإضافة نفسها؛ فذلك يعتمد على صيغة الإنزيم والوسط والركيزة [12].



**Figure 4.** 전분 기반 발효에서는 일반적으로 알파-아밀레이스에 의한 액화 공정을 보완 효소에 의한 당화 및 미생물 발효와 분리해 진행한다

## تطبيقات في الإيثانول والوقود الحيوي

في إنتاج الإيثانول من مواد نشوية، يكون تسهيل النشا خطوة جوهرية قبل إنتاج السكريات القابلة للتخمير. Thermostable Alpha Amylase يساعد على جعل الهريس الساخن أقل لزوجة وأكثر استعدادًا للسكر، ثم تتولى إنزيمات أخرى والكائنات المخمرة تحويل السكريات إلى إيثانول. لذلك يظهر هذا الإنزيم في قلب العلاقة بين هندسة المعالجة الحيوية والتحكم في قابلية الكربوهيدرات للتحول [8].

الدراسات التي تناولت التخمير المتزامن مع السكر أو المعالجة عالية المواد الصلبة تؤكد أن العائد لا يعتمد فقط على وجود سكريات كلية في المادة الخام، بل على تحريرها في الوقت والشكل المناسبين. في دراسة عن إنتاج الإيثانول عالي العائد باستخدام مخلفات نباتية مشتركة، كان تصميم التغذية والمواد الصلبة والسكر والتخمير جزءًا من تحسين الأداء، وهو مبدأ ينطبق كذلك على النظم النشوية التي تحتاج تسهيلًا فعالًا قبل التخمير [2].

في الوقود الحيوي، تمثل اللزوجة مشكلة تشغيلية واقتصادية. فالهريس الكثيف يحتاج طاقة أعلى للخلط وقد يسبب عدم تجانس موضعي في التفاعل. عندما يخفض Thermostable Alpha Amylase اللزوجة مبكرًا، فإنه لا يضيف سكريات قابلة للتخمير فقط، بل يحسن البيئة الفيزيائية التي تعمل فيها الإنزيمات والكائنات، وهذا قد يكون حاسمًا في عمليات عالية المواد الصلبة [9].

## التقطير والمشروبات المخمرة القائمة على الحبوب

في الهريس المستخدم للمشروبات المخمرة أو التقطير، مثل التطبيقات الحبوبية، تتمثل القيمة العملية في تحرير الكربوهيدرات من النشا دون جعل الوسط شديد اللزوجة أو غير متجانس. إنزيم Thermostable Alpha Amylase يدعم مرحلة الهريس الساخن عبر تقليل طول السلاسل النشوية، ما يحسن قابلية السكر اللاحقة ويزيد انتظام المواد المتاحة للخميرة أو الكائنات المخمرة الأخرى [13].

قد تكون المواد الخام في هذه التطبيقات أكثر تعقيدًا من النشا الصناعي المنقى، لأنها تحتوي على قشور وبروتينات ومواد ذائبة تؤثر في القوام والانتقال الكتلي. لذلك يكون التسييل الإنزيمي جزءًا من ضبط القوام وليس مجرد خطوة كيميائية. استخدام ألفا-أميليز مقاوم للحرارة يمنح مرونة أكبر عندما تتزامن الجلتنة والتحلل الجزئي في بيئة ساخنة [1].

مع ذلك، يجب الحفاظ على التمييز بين الإنزيم كأداة معالجة وبين خصائص المنتج النهائي. النكهة، ونمط الأحماض العضوية، والمركبات العطرية، وكفاءة الخميرة، كلها عوامل تتأثر بالكائنات والمواد الخام وظروف التخمر. وقد أظهرت دراسات عزل الخمائر عالية إنتاج مركبات نكهية، مثل إيثيل كابرولات، أن تحسين التخمر يتضمن اختيار الكائنات وتحسين ظروفها، وليس تحرير السكريات وحده [14].



**Figure 5.** 내열성 알파-아밀레이스는 옥수수, 밀, 카사바, 쌀, 보리, 감자, 고구마 및 전분질 잔류물과 같은 전분이 풍부한 원료에 적합하다

## معالجة النشا والسكر قبل التخمر

في صناعات النشا والسكر، تُستخدم ألفا-أميليز الحرارية عادةً لتسييل النشا قبل تحويله إلى شرابات أو سكريات أبسط. هذه الخطوة نفسها يمكن أن تكون مقدمة لتخمير كيميائيات حيوية أو أحماض عضوية أو كحولات، لأن نوع السكر المتاح وتركيزه وتوقيت إنتاجه يؤثر في سلوك الكائن المخمر وفي تراكم المنتجات [1].


في إنتاج حمض اللاكتيك من مخلفات قهوة، مثلًا، يوضح البحث الحديث أن اختيار المادة الخام والتحلل والتخمير المناسب للركيزة عناصر أساسية لإنتاج عالي العائد. ورغم أن هذه الدراسة لا تجعل Thermostable Alpha Amylase حلًا عامًا لكل المخلفات، فإنها تؤكد المبدأ الأوسع: التخمير عالي العائد يبدأ من جعل الكربوهيدرات في صورة يستطيع الكائن استخدامها بكفاءة [15].

بالنسبة للمواد الغنية بالنشا، تكون ألفا-أميليز الحرارية مفيدة تحديدًا لأن النشا يحتاج فتحًا حراريًا وإنزيميًا. أما إذا كانت الركيزة غنية بالسليولوز أو الهيميسليولوز أكثر من النشا، فقد تكون الحاجة الأكبر لإنزيمات ليفية، مع بقاء الأميليز مفيدًا فقط في الجزء النشوي من المصفوفة [16].

## العوامل التي تحدد الأداء دون تحويلها إلى بروتوكول

يعتمد أداء Thermostable Alpha Amylase على طبيعة الركيزة، ودرجة جلتنة النشا، وتركيز المواد الصلبة، وتجانس الخلط، وملاءمة الوسط الكيميائي للإنزيم، وترتيب إضافة الإنزيمات الأخرى. هذه العوامل لا تغيّر آلية الإنزيم الأساسية، لكنها تحدد مقدار ما يستطيع الوصول إليه من روابط داخل السلاسل النشوية، ومدى سرعة انخفاض اللزوجة، وكمية الديكستريانات الناتجة [11].

تركيز المواد الصلبة عامل مهم في عمليات "العائد العالي" لأن زيادة المادة الخام قد ترفع الإنتاجية الحجمية، لكنها تزيد اللزوجة وتحديات انتقال الكتلة. لذلك تظهر قيمة ألفا-أميليز الحراري بصورة أوضح في الأنظمة الكثيفة، حيث يؤدي تقصير السلاسل إلى تحسين قابلية الخلط وتقليل المناطق غير المتجانسة. وقد أبرزت دراسات التخمير عالي المواد الصلبة أن التكامل بين التحلل الإنزيمي والتخمير ضروري للتعامل مع هذه القيود [2].



**Figure 6.** كالسيوم و غيره من الفلزات هي أيونات معدنية تعمل على تثبيت الإنزيم وتثبيت الركيزة. يمكن أن تساعد على تثبيت الإنزيم في المواقع النشطة.

كما أن نوع الكائن المخمّر يؤثر في تفسير النتائج. بعض الكائنات تستهلك الجلوكوز بكفاءة، وبعضها يستطيع التعامل مع سكريات قصيرة أو مزيج سكري، وبعضها يتأثر بالمثبطات أو الضغط الأسموزي. لذلك، حتى لو أدى Thermostable Alpha Amylase إلى تسييل ممتاز، فقد يتطلب تحقيق عائد عالٍ توافقًا بين السكريات الناتجة ومتطلبات الكائن المخمّر [17].

## حدود ما يمكن توقعه من الإنزيم


أقوى ما تدعمه الأدبيات هو أن ألفا-أميليز تقطع روابط  $\alpha$ -1,4 في النشا وتنتج ديكستريانات وسكريات أقصر، وأن الأشكال الحرارية منها مناسبة للمعالجة التي تجمع بين الجلتننة والتحلل في وسط ساخن. هذا أساس علمي راسخ لا يعتمد على ادعاء تسويقي، بل على توصيف إنزيمي واسع لمصادر ميكروبية متعددة وتطبيقات صناعية متكررة [1].

أما "العائد العالي" فهو نتيجة منظومية. لا يمكن نسبة عائد تخمير محدد إلى Thermostable Alpha Amylase وحده، لأن العائد يتأثر بالسكّرة النهائية، وبالمثبطات، وبسلسلة التخمير، وبالمغذيات، وبإدارة العملية. دراسات الإيثانول من مواد نباتية معالجة، مثل قش الأرز أو أخشاب ورقية معالجة، تُظهر أن العائد يتحسن عندما تنجح سلسلة المعالجة والتحلل والتخمير كلها، لا عندما تُحسن خطوة واحدة بمعزل عن الباقي [10].

كذلك لا ينبغي افتراض أن ألفا-أميليز يحلل النشا الخام دائمًا بالفاعلية نفسها التي يحققها مع النشا المجلتن. بعض الأميليزات تُدرس لقدرتها على هضم النشا الخام، لكن هذا مجال خاص يعتمد على بنية الإنزيم والركيزة. وقد وُصفت أميليزات معينة بأنها قادرة على هضم النشا الخام بدرجات متفاوتة، لكن ذلك لا يلغي أن الجلتننة تظل خطوة أساسية في كثير من العمليات الصناعية [11].

## اعتبارات السلامة والاستخدام المهني

الإنزيمات الصناعية بروتينات فعالة وقد تسبب حساسية أو تهيجًا عند سوء التعامل، خصوصًا في صورة مساحيق أو رذاذ أو محاليل مركزة. لذلك يجب استخدامها ضمن بيئات مهنية مناسبة، وبما يتوافق مع وثائق السلامة واللوائح المحلية وطبيعة التطبيق المقصود. توفر وثيقة SDS معلومات السلامة ذات الصلة، بينما تساعد CoA على ربط الطلب بالمعلومات النوعية المرفقة معه.



**Figure 7.** 알파-아밀레이스는 주로 전분을 액화하는 반면, 글루코아밀레이스, 가지절단 효소, 베타-아밀레이스는 하류 단계에서 서로 다른 탄수화물 전환 역할을 수행한다

Enzymes.bio يورّد المنتج عبر الإنترنت بوحدة 1 kg، ولا ينبغي فهم معلومات المنتج أو هذه الوثيقة على أنها بروتوكول تصنيع أو اختبار داخلي من Enzymes.bio. المنتجات موجهة للاستخدام المهني والصناعي والبحثي، ويظل المستخدم مسؤولاً عن ملاءمة التطبيق والامتثال التنظيمي في بلده وقطاعه .

## الخلاصة الفنية

Thermostable Alpha Amylase للتخمير عالي العائد هو إنزيم تسييل للنشا قبل السكّرة والتخمير، يعمل عبر قطع روابط  $\alpha$ -1,4 الداخلية في الأميلوز والأميلوبكتين لإنتاج ديكستريانات وسكريات قصيرة وخفض لزوجة الهريس. أهميته العملية تظهر في الأنظمة النشوية الساخنة أو عالية المواد الصلبة، حيث يصبح خفض اللزوجة وتحسين إتاحة الكربوهيدرات شرطين أساسيين لتخمير أكثر كفاءة [1].

القيمة الحقيقية للإنزيم ليست في كونه "حلاً منفرداً"، بل في إدماجه داخل عملية متوازنة تشمل تحضير الركيزة، التسييل، السكّرة، اختيار الكائن المخمّر، والتحكم في ظروف التشغيل. عند استخدامه في الموضع المناسب، يدعم Thermostable Alpha Amylase مسارًا أكثر قابلية للتنبؤ في إنتاج الإيثانول، والتقطير، والمشروبات المخمرة القائمة على الحبوب، وتحويل النشا إلى ركائز تخمير صناعية [8].

Enzymes.bio يتيح هذا المنتج للشراء المباشر عبر الإنترنت بوحدة 1 kg، مع إرفاق CoA و SDS مع الطلب. وتبقى Enzymes.bio مورّدًا للإنزيمات وليست جهة تصنيع أو مختبرًا، لذلك يجب قراءة المعلومات الفنية كدعم لاختيار الاستخدام المهني لا كتعهد أداء مستقل عن تصميم العملية .

## اطلب **Thermostable Alpha Amylase For High Yield Fermentation** عبر الإنترنت

يُباع بوحدة 1 kg، وهو متوفر في المخزون وجاهز للشحن. اطلب مباشرة من متجرنا — ادفع عبر الإنترنت وسنعالج طلبك. تُرفق شهادة التحليل ونشرة بيانات السلامة مع كل طلب.

→ **Thermostable Alpha Amylase For High Yield Fermentation** اشتر

## المراجع

مرقمة حسب ترتيب أول اقتباس. مصادر مفتوحة الوصول، تم التحقق من إتاحتها عند النشر؛ وترتبط أرقام الاستشهاد في النص هنا.

1. Vala, V., Suhagia, T. A., Raina, V., Gurjar, A., Srivastava, S. K., Jain, P., & Alle, M. (2025). Thermostable amylases from thermophilic microbes: advances in production, engineering, and industrial applications. *Nanotechnology*, 37.
2. Zheng, T., Yu, H., Liu, S., Jiang, J., & Wang, K. (2020). Achieving high ethanol yield by co-feeding corncob residues and tea-seed cake at high-solids simultaneous saccharification and fermentation. *Renewable Energy*, 145, 858-866.
3. Kurniawan, D. C., Rohman, M. S., & Witasari, L. (2024). Heterologous expression, characterization, and application of recombinant thermostable  $\alpha$ -amylase from *Geobacillus* sp. DS3 for porous starch production. *Biochemistry and Biophysics Reports*, 39.
4. Soma, M. (2024). Thermostable Amylopullulanases: Sources and Applications. *Industrial Biotechnology*, 20, 268 - 278.
5. Chauhan, G., Kumar, V., Arya, M., Kumari, A., Srivastava, A., Khanna, P., & Sharma, M. (2023). Mining of Thermostable Alpha-amylase Gene from Geothermal Springs using a Metagenomics Approach. *Journal of Pure and Applied Microbiology*.
6. Bandara, Y. (2024). Isolation and identification of thermostable amylase enzyme producing bacteria from compost production plant in Kurunegala. *The 24th International Postgraduate Research Conference*.
7. Fazil, M. M., Javed, I., Ali, K., Waheed, H., & Dastagir, N. (2023). Production Optimization and Industrial Applications of Amylase From Indigenous Bacterial Species Using Banana Peels. *BioSight*.
8. Ajayo, P. C., Wang, Q., Huang, M., Zhao, L., Tian, D., He, J., Fang, D., ... et al. (2023). High bioethanol titer and yield from phosphoric acid plus hydrogen peroxide pretreated paper mulberry wood through optimization of simultaneous saccharification and fermentation. *Bioresource Technology*, 128759.
9. Xu, C., Xiong, Y., Zhang, J., Li, K., Zhong, S., Huang, S., Xie, C., ... et al. (2022). Liquid hot water pretreatment combined with high-solids enzymatic hydrolysis and fed-batch fermentation for succinic acid sustainable processed from sugarcane bagasse. *Bioresource Technology*, 128389.

- Ningthoujam, R., Jangid, P., Yadav, V., Sahoo, D. K., Patel, A., & Dhingra, H. (2023). Bioethanol production from alkali-pretreated rice straw: effects on fermentation yield, structural characterization, and ethanol analysis. *Frontiers in Bioengineering and Biotechnology*, 11
- Barman, D., & Dkhar, M. S. (2023). Purification and characterization of moderately thermostable raw-starch digesting  $\alpha$ -amylase from endophytic *Streptomyces mobaraensis* DB13 associated with *Costus speciosus*. *Journal of General and Applied Microbiology*
- Abedi, E., Torabizadeh, H., & Orden, L. (2023). Enhancement of Alpha-amylase's Stability and Catalytic Efficiency After Modifying Enzyme Structure Using Calcium and Ultrasound. *Food and Bioprocess Technology*, 17, 1546 - 1562
- Porfirif, M. C., Milatich, E. J., Farruggia, B., & Romanini, D. (2016). Production of alpha-amylase from *Aspergillus oryzae* for several industrial applications in a single step. *Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences*, 1022, 87-92
- Fan, G., Liu, P., Chang, X., Yin, H., Cheng, L., Teng, C., Gong, Y., ... et al. (2021). Isolation and Identification of a High-Yield Ethyl Caproate-Producing Yeast From Daqu and Optimization of Its Fermentation. *Frontiers in Microbiology*, 12
- Kim, S., Kim, J., Kim, Y. Y., Yang, J., Lee, H. M., Hwang, I., Park, H. W., ... et al. (2023). Utilization of coffee waste as a sustainable feedstock for high-yield lactic acid production through microbial fermentation. *Science of the Total Environment*, 169521
- Li, J., Yuan, X., Dong, Z., Mugabe, W., & Shao, T. (2018). The effects of fibrolytic enzymes, cellulolytic fungi and bacteria on the fermentation characteristics, structural carbohydrates degradation, and enzymatic conversion yields of Pennisetum sinense silage. *Bioresource Technology*, 264, 123-130
- Hao, Y., Ma, Q., Liu, X., Fan, X., Men, J., Wu, H., Jiang, S., ... et al. (2020). High-yield production of L-valine in engineered *Escherichia coli* by a novel two-stage fermentation. *Metabolic Engineering*

## تواصل مع Enzymes.bio

هل لديك أسئلة حول طلب؟ يسرّ فريقنا مساعدتك.

→ تواصل معنا

الهاتف (الولايات المتحدة) +1 (507) 6057-428

البريد الإلكتروني wholesale@enzymes.bio

54 نخدم العملاء حول العالم

+60 شركاء بحثيون جامعيون

+400 عملاء B2B

Enzymes.bio 2026 · توريد إنزيمات صناعية & لمعالجة الأغذية · غير مخصص للاستهلاك البشري أو البيع بالتجزئة.